

気仙沼湾・広田湾貝毒プランクトン調査結果




表: 今回(4月13日)の調査結果

| 調査地点 | 水温 | 塩分 | 貝毒プランクトン出現数(細胞数/L) | | | | 備考 |
|-------|------|-------|--------------------|------------|--------------|----------------|----|
| | | | Alexandrium | Dinophysis | | | |
| | | | | D. fortii | D. acuminata | その他のDinophysis | |
| ①港町 | 8.03 | 31.80 | 30 | 10 | 120 | 0 | |
| ②母体田 | 7.78 | 32.27 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| ③二ツ根 | 8.22 | 32.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ④岩井崎 | 7.61 | 32.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ⑤大島瀬戸 | 7.55 | 32.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ⑥舞根 | 7.71 | 32.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ⑦唐島 | 7.32 | 32.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ⑧滝浜 | 7.30 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ⑨石浜 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ⑩大沢 | 6.50 | - | 10 | 0 | 0 | 0 | |

※Alexandriumは麻痺性貝毒、D. fortiiとD. acuminataは下痢性貝毒の原因プランクトンです。
 ※水温、塩分、プランクトンは水深0~10 mの柱状採水によるサンプルのデータです。

