

令和7年産



気仙沼・南三陸 稲作情報 号外【臨時】

令和7年8月19日発行

宮城県米づくり推進気仙沼地方本部・宮城県気仙沼農業改良普及センター

TEL 0226-25-8069 FAX 0226-22-1606

斑点米カメムシ類の発生が多い場合は追加防除を実施しましょう！

- 病害虫防除所から、斑点米カメムシ類についての注意報第3号（7月18日発行）が出されています。
- 本年は斑点米カメムシ類のうち、県の最主要種であるアカスジカスミカメ以外のカメムシ類（クモヘリカメムシ、ホソハリカメムシ）も平年より多く確認されています。
- 斑点米カメムシ類の薬剤防除は、水稻の「穂揃期」と「その7日～10日後」の2回が基本です。
- **基本の薬剤防除を実施した後も水田内に斑点米カメムシ類の発生が見られる場合は、追加防除の実施を検討しましょう。**
- **特に、クモヘリカメムシなどの比較的大型の斑点米カメムシ類が多い場合は、追加防除の実施が効果的です。**
- イヌホタルイやヒエ類などの水田雑草が多発しているほ場では、斑点米カメムシ類の発生が多くなりやすいため、基本防除の実施後も、水田内をよく確認しましょう。

〈管内で特に注意すべき斑点米カメムシ類〉



写真 アカスジカスミカメ



写真 クモヘリカメムシ



写真 ホソハリカメムシ

〈被害粒（斑点米）の例〉



〈斑点米カメムシ類のサイズ比較〉



A B C D E 粳

A：アカヒゲホソミドリカスミカメ

B：アカスジカスミカメ

C：フタトゲムギカスミカメ

D：ホソハリカメムシ

E：クモヘリカメムシ



斑点米カメムシ類
の発生状況と防除
対策（宮城県公式
ウェブサイト）

■ 防除薬剤について

ジノテフラン液剤（スタークルメイト液剤 10等）、エチプロール水和剤（キラップフロアブル）、スルホキサフロル水和剤 20（エクシードフロアブル）はアカスジカスミカメに対する高い防除効果が確認されています。



（参考）
斑点米カメムシ類
の発生状況と防除
対策（宮城県公式ウ
ェブサイト）



※薬剤選定の参考
『宮城県農作物病害
虫・雑草防除指針』

農業作業中の熱中症を予防しましょう！

予防のポイント

- ・暑さを避ける
高温時の作業は極力避け、日陰や風通しのよい場所で作業
- ・こまめな休憩と水分補給
喉の渇きを感じる前に、こまめに水分・塩分を補給
- ・単独作業は避ける
複数名で作業を行う、時間を決めて連絡をとりあう
- ・熱中症対策アイテムの活用
帽子や吸湿速乾性の衣服の着用、空調服や送風機の活用



熱中症対策
農林水産省 HP

宮城県農薬危害防止運動実施中（6／1～8／31）

- ・農薬容器のラベルをよく読みましょう
- ・土壌くん蒸剤を使用した後の適切な管理をしましょう
- ・住宅地等で農薬を使用する際には、周辺への配慮及び飛散防止対策をしましょう
- ・農薬の保管管理を徹底しましょう



（参考）
農薬は正しく
使いましょう
（宮城県公式
ウェブサイト）



農薬危害防止運動
リーフレット