



# 自分でできる！蚊の発生対策

誰でも蚊に吸血されてかゆみに悩まされたことがあると思います。  
蚊は様々な感染症を媒介する場合があります。  
蚊の発生を抑えることにより、快適な生活環境と健康を守りましょう。



- 蚊の種類にもよりますが、成虫が水たまりに卵を産み付けてから約2週間で成虫になると言われています。
- 蚊の発生を抑制する対策としては、成虫になってから駆除するよりも、幼虫（ボウフラ）が発生しないような対策（=水たまりを無くす）をとったほうが効果的であると言われています。
- 日頃から家の周りなど見回って、発生源となる水たまりを無くしましょう。

## 【身近な蚊の発生源の例】

<p><b>屋外放置の空き缶や空き瓶</b> 撤去するか、雨の当たらない場所へ移動する。</p>	<p><b>屋外の古タイヤ</b> 撤去するか、雨の当たらない場所へ移動する。</p>	<p><b>屋外のバケツやたらい</b> 不必要なものは撤去し、散水用の貯水等で必要な場合はこまめに交換する。</p>
<p><b>雨水升</b> 定期的に清掃する。</p>	<p><b>植木鉢の受け皿</b> こまめに捨て、水を溜まったらそのままにしない。</p>	<p><b>庭先の水がめ（水生植物）</b> 水をこまめに交換し、清掃する。</p>