


# 安定ヨウ素剤事前配布説明会

---

安定ヨウ素剤の事前配布について

# 安定ヨウ素剤を事前配布する地域 【PAZ・準PAZ】



## <概ね5km圏内>

**PAZ**(予防的防護措置を準備する区域):

Precautionary Action Zone

⇒ 急速に進展する事故を想定し, 事故が発生したら直ちに避難等を実施する区域

1市1町(女川町, 石巻市)住民数:1,113人※

## <PAZ外の離島, 牡鹿半島地域>

PAZに準じた避難等の防護措置を準備する区域:

1市1町(女川町, 石巻市) 住民数:2,376人※

※人口は, 平成31年4月1日現在

もしもの原子力災害に備えて、  
安定ヨウ素剤を事前配布します。

**原子力災害のおそれ：避難が基本**

**避難中の被ばく予防：安定ヨウ素剤服用**

**Q1** . 原子力災害が発生した場合、被ばくを防ぐために  
・全体としては、どのような対策が取られるのですか？

**A** : 外部被ばくと内部被ばくの両方を防ぐことが基本です。

**外部被ばく**

遠ざかる  
さえぎる  
速く離れる

**内部被ばく**

食品の摂取制限  
うがい・手洗い  
**安定ヨウ素剤**

## Q2 : 安定ヨウ素剤とは何ですか？

- A . 安定ヨウ素剤は医療用の医薬品です。  
A . 放射性ヨウ素による内部被ばくを抑える効果があります。



[安定ヨウ素剤]

**Q3** : 安定ヨウ素剤は、なぜ事前に配布するのですか？

**A** : 避難が必要となるような原子力災害の発生時に、混乱なく安定ヨウ素剤を服用いただくために、事前にお配りいたします。

- ・福島事故では災害対応に追われ、配布に混乱が生じた
- ・間違えて飲まないように注意が必要！

**Q4**：安定ヨウ素剤は、何歳でも服用する必要がありますか？

**A**：40歳以上の方は服用する必要性は低いとされています。また、未成年者・妊婦・授乳婦は服用を優先すべき対象者です。

**PAZ, 準PAZ内に居住している**

- **40歳未満の方**
- **40歳以上の妊婦・授乳婦・拳児希望のある女性**
- **40歳以上の方で事前配布を希望する方**

**に、安定ヨウ素剤を事前配布します。**

**Q5** .では、安定ヨウ素剤は、  
.いつ、服用すれば良いのでしょうか？

**A** . 安定ヨウ素剤は、国または地方自治体の指示があった  
.ときに、適切な量を服用してください。

**服用のタイミングが大変重要**

**国又は地方自治体(県, 市)の指示に従い服用**

**服用回数は原則1回**

**(やむを得ない場合は複数回服用することもある)**



**Q6** .安定ヨウ素剤を服用できない人は、災害発生時にどうすればいいのでしょうか？

**A** : 安定ヨウ素剤が必要になる前に、早めに避難します。

**アレルギー等があり、服用に適さない方については、全員が避難する段階より前に避難します。**

## 安定ヨウ素剤の保管方法

- 直射日光の当たらない湿気の少ない所  
⇒ **冷蔵庫**に保管
- **使用期限は**  
丸 剤： 製造から5年  
ゼリー剤： 製造から3年  
⇒ **使用期限前に更新が必要**
- 他人に渡さない

国や自治体が指示を出します

まずは落ち着いて

防災広報無線などで指示を確認