

ワカメ養殖通報（第1報）

令和8年9月4日



宮城県水産技術総合センター気仙沼水産試験場

電話 0226(41)0652

宮城県気仙沼地方振興事務所水産漁港部

宮城県漁業協同組合関係支所

<協力機関>仙台管区気象台

- ・ 調査点における水温は、表層(0m)が22.4~23.5℃、2.5mで22.5~22.8℃でした。
- ・ 表層の栄養塩は、三態窒素については0.9~49 $\mu\text{g/L}$ 、リン酸態リンについては0.1未満~5 $\mu\text{g/L}$ でした。
- ・ 漁場の水温が23℃以下、概ね20℃台になったら芽出し作業を行うなど、直近の水温に注意してください。
- ・ 「みやぎ水産NAVI」(<https://suisan-navi.pref.miyagi.jp/index.html>)の定地水温情報などが閲覧できます。



○気仙沼湾（杉ノ下）の表層水温

- ・ 直近の水温（9月3日午後3時）は、23.8℃です。
- ・ 旬平均水温は、9月上旬(3日まで)で23.6℃となっており、昨年より2.1℃低いですが、平年値よりは1.2℃高い水温となっております。




図 気仙沼湾（杉ノ下）表層平均水温の推移

○次回は9月9日（水）に発行の予定です。

ワカメ養殖通報はホームページ (<http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kesenmuma-s/>) でご覧になれます。

○各調査点の水温・塩分・透明度・栄養塩濃度

【調査日:9月2日】


海域		調査点	調査日	水温(°C)				塩分		透明度 (m)	栄養塩(μg/L)			
				0m	2.5m	5m	10m	0m	2.5m		0m		2.5m	
											三態窒素	リン酸態P	三態窒素	リン酸態P
気仙沼湾	西湾	岩井崎	9/2	22.7	22.5	22.5	22.4	31.6	33.4	10.0	2	0.4	2	<0.1
		大口	9/2	22.4	22.7	22.5	22.6	29.7	33.2	5.0	8	<0.1	5	1
		階上	9/2	22.4	22.7	22.6	—	27.6	33.2	7.0	6	<0.1	8	0.3
		松岩	9/2	23.5	22.8	22.6	22.3	23.2	32.9	4.5	49	4	1	<0.1
		小々汐	9/2	23.1	22.8	22.6	—	29.5	32.8	4.5	18	2	2	1
	東湾	唐島	9/2	23.0	22.7	22.6	22.5	32.5	33.3	9.0	1	<0.1	0.4	<0.1
小泉湾	前浜	9/2	22.6	—	—	—	29.8	—	—	4.8	<0.1	—	—	
	赤牛	9/2	22.6	—	—	—	30.1	—	—	1	<0.1	—	—	
	大谷	9/2	22.5	—	—	—	27.8	—	—	46	5	—	—	
	大谷沖	9/2	22.6	—	—	—	29.3	—	—	2	0.1	—	—	

※ 三態窒素は20 μg/L以下、リン酸態リンは3 μg/L以下の状態が続くと生長停滞や芽落ちのおそれがあります。

※ 「-」は欠測

○1 週間先の海況予報（表層0m水温）（令和8年9月4日時点）

<国立研究開発法人水産研究・教育機構「改良版我が国周辺の海況予報システム（FRA-ROMSII）」から抜粋>



- 【本県沿岸域の表面水温予報】
- ・概ね24℃台で推移することが予想されております。
 - ・一方、常磐海域以南の沖合には水温26～28℃台の暖水が存在することが予想されております。
 - ・暖水の動向や本県沿岸域への接岸について注視し、今後発行する通報で状況をお知らせさせていただきます。