

○水稲（側条）

用途別	IRAC/FRACコード	有効成分名	薬剤名	希釈倍数・使用量	使用時期	使用回数	いもち病	紋枯病	イネドロオウムシ	イネミズゾウムシ	備考
殺虫殺菌剤	I:4A/F:P3	クロチアニジン／イソチアニル	ツインターボ顆粒水和剤	100g/10a	移植時（ペースト肥料に混合し側条施肥田植機で施用する。）	1	○		○	○	
	I:28/F:P2	クロラントラニプロール／プロベナゾール	D r. オリゼフェルテラ粒剤	1kg/10a	移植時（側条施用）	1	○		○	○	
	I:28/F:P2	クロラントラニプロール／プロベナゾール	側条オリゼメートフェルテラ顆粒水和剤	500g/10a	移植時（ペースト肥料に混合し側条施肥田植機で施用する。）	1	○		○	○	
	I:28/F:16.1	シアントラニプロール／ピロキロン	デジタルミネクト箱粒剤	1kg/10a	移植時（側条施用）	1	○		○	○	
	I:28/F:16.3	シアントラニプロール／トルプロカルブ	ツインキック箱粒剤	1kg/10a	移植時（側条施用）	1	○		○	○	
	I:28/F:P2	シアントラニプロール／プロベナゾール	D r. オリゼパディート粒剤	1kg/10a	移植時（側条施用）	1	○		○	○	
	I:-/F:P2	フルピリミリン／プロベナゾール	D r. オリゼリディア箱粒剤	1kg/10a	移植時（側条施用）	1	○		○	○	
	I:4A/F:P3/F:7	クロチアニジン／イソチアニル／フラメトピル	箱大臣粒剤	1kg/10a	移植時（側条施用）	1	○	○	○	○	
	I:28/F:7/F:P2	クロラントラニプロール／チフルザミド／プロベナゾール	D r. オリゼフェルテラグレートム粒剤	1kg/10a	移植時（側条施用）	1	○		○	○	
	I:28/F:3/F:16.3	シアントラニプロール／シメコナゾール／トルプロカルブ	トリプルキック箱粒剤	1kg/10a	移植時（側条施用）	1	○		○	○	
	I:28/F:P3	シアントラニプロール／イソチアニル	スタウトパディート箱粒剤	1kg/10a	移植時（側条施用）	1	○		○	○	
	I:28/F:P3	シアントラニプロール／イソチアニル	ルーチンデュオ箱粒剤	1kg/10a	移植時（側条施用）	1	○		○	○	
	I:28/F:P3	シアントラニプロール／イソチアニル	ルーチンパンチ箱粒剤	1kg/10a	移植時（側条施用）	1	○		○	○	
	I:28/F:P8	シアントラニプロール／ジクロベンチアゾクス	ブーンパディート箱粒剤	1kg/10a	移植時（側条施用）	1	○		○	○	
	I:-/F:P2/F:C2	フルピリミン／プロベナゾール／ペンフルフェン粒剤	C s. オリゼリディアE V箱粒剤	1kg/10a	移植時（側条施用）	1	○		○	○	
	I:-/F:P2	フルピリミン／プロベナゾール	C s. オリゼリディア箱粒剤	1kg/10a	移植時（側条施用）	1	○		○	○	
	I:4F/F:P2	フルピリミン／プロベナゾール	G Pオリゼリディア箱粒剤	1kg/10a	移植時（側条施用）	1	○		○	○	
殺虫剤	I:14	カルタップ	パダンSG水溶剤	200g/10a	移植時（ペースト肥料に溶かし側条施肥田植機で施用する。）	1			○	○	希釈倍数使用量「200g/10a」を採用

注1）IRAC/FRACコード欄の「I:」は殺虫剤のIRACコード、「F:」は殺菌剤のFRACコードを示す。

注2）同名の剤であっても農薬会社によっては登録内容が異なることもあるので、使用する際は農薬の容器（袋）のラベルを確認する。