

○水稻（殺菌剤（箱施用剤を除く））

FRAC コード	有効成分名	薬剤名	希釈倍数・使用量	使用時期	使用 回数	稲 こ う じ 病	い も ち 病	疑 似 紋 枯 症	こ ま 葉 枯 病 ／ 種 子 消 毒	穂 枯 れ ／ こ ま 葉 枯 病 菌	白 葉 枯 病	墨 黒 穂 病	苗 立 枯 細 菌 病	苗 立 枯 病	ば か 苗 病	も み 枯 細 菌 病	紋 枯 病	備 考	
32	ヒドロキシイソキサゾール	タチガレン粉剤	6g/箱	播種前（育苗箱土壌混和）	1									a				●「育苗箱土壌混和」希釈倍数使用量「6g/箱」を採用 ●「折衷苗代」希釈倍数使用量「50g/㎡」を採用 ●「畑苗代」希釈倍数使用量「50g/㎡」を採用	
			50g/㎡	播種前（折衷苗代）								a							
			50g/㎡	播種前（畑苗代）							a								
32	ヒドロキシイソキサゾールカリウム	タチガレン液剤	500～1000倍、500mL/箱	播種時又は発芽後	2									a					
31	オキシリニック酸	スターナ水和剤	乾燥種子重量の0.5%	浸種前（種子湿粉衣）	1								○				○		
			20倍	浸種後（10分間種子浸漬）						○			○						
			200倍	浸種前（24時間種子浸漬）						○			○						
1	ペノミル	ベンレート水和剤	500倍、500mL/箱	播種時1回又は播種時と播種7日後頃の2回	2									b					
20	ペンシクロン	モンセレン粉剤DL	3～4kg/10a	収穫21日前まで	4													○	
7	フルトラニル	モンカットファイン粉剤2ODL	3～4kg/10a	収穫14日前まで	3 4													○	
7	フルトラニル	モンカット粒剤	3～4kg/10a（湛水散布）	出穂30～10日前　ただし、収穫14日前まで	3 4													○	
7	フルトラニル	モンカットフロアブル	ブームスプレーヤー　300倍、25L/10a	収穫14日前まで	3 4													○ ●「散布」（1000～1500倍採用）	
			1000～1500倍																
7	フラメトピル	リンパー粒剤	3～4kg/10a	収穫30日前まで	2			①										○	
7	ペンフルフェン	エパーゴルシードFS	（乾田直播を除く）乾燥種もみ1kg当たり原液10mlを塗抹処理（専用の種子被覆剤を加用）	播種前	1			③										○	●「乾田直播水稻：塗抹処理（専用の種子被覆剤を加用）」は、希釈倍数・使用量「乾燥種もみ1kg当たり原液10ml」を採用
			（乾田直播を除く）乾燥種もみ1kg当たり原液10mlをコーティング中又はコーティング後の種もみに塗抹処理	播種前												○			
			（乾田直播のみ）乾燥種もみ1kg当たり原液10mlを塗抹処理（専用の種子被覆剤を加用）	播種前				③								○			

○水稻（殺菌剤（箱施用剤を除く））

[illegible]

○水稻（殺菌剤（箱施用剤を除く））

FRAC コード	有効成分名	薬剤名	希釈倍数・使用量	使用時期	使用 回数	稲 こ う じ 病	い も ち 病	疑 似 紋 枯 症	ご ま 葉 枯 病 ／ 種 子 消 毒	穂 枯 れ ／ ご ま 葉 枯 病 菌	白 葉 枯 病	墨 黒 穂 病	苗 立 枯 細 菌 病	苗 立 枯 病	ば か 苗 病	も み 枯 細 菌 病	紋 枯 病	備 考
16. 1	ピロキロン	コラトップ 1 キロ粒剤 1 2	1～1. 5kg/10a	葉いもちに対しては初発10日前～初発時、穂いもちに対しては出穂30日前～5日前まで	2		○											
			無人航空機 1kg/10a				○											
16. 1	ピロキロン	コラトップ粒剤 5	3～4kg/10a	葉いもちに対しては初発10日前～初発時、穂いもちに対しては出穂30日前～5日前まで	2		○											
16. 1	ピロキロン	コラトップジャンボP	小包装（ﾊﾞｯｸ）10～13個（500～650g）/10a	葉いもちに対しては初発20日前～初発時、穂いもちに対しては出穂30日前～5日前まで	2		○											
16. 3	トルプロカルブ	ゴウケツパック	小包装（ﾊﾞｯｸ）10個（450g）/10a	出穂5日前まで ただし収穫30日前まで	1		○											
16. 3	トルプロカルブ	ゴウケツ粒剤	3～4kg/10a	出穂5日前まで ただし収穫30日前まで	1		○											
P2	プロベナゾール	オリゼメート粒剤	3～4kg/10a	葉いもちは初発の10日前～初発時	2		○											
				移植活着後及び出穂3～4週間前 ただし収穫14日前まで						○								
P3	イソチアニル	ルーチンシードFS	乾燥種もみ1kg当たり原液6～12mlを塗抹処理（専用の種子被覆剤を加用）	播種前（浸種前）	1		○											
			乾燥種もみ1kg当たり原液6～12mlをコーティング中又はコーティング後の種もみに塗抹処理	播種前（浸種後）	1		○											
U16	テブフロキン	トライフロアブル	1000倍	収穫14日前まで	2		○											
			ブームスプレーヤー 250倍、25L/10a				○											
			無人航空機 8倍、0. 8L/10a				○											
U17	ピカルブトラゾクス	ナエファインフロアブル	1000倍、0. 5L/箱	播種時（土壌灌注）	2									a, d				
			2000倍、1L/箱											a, d				
U17	ピカルブトラゾクス	ナエファイン粉剤	6～8g/箱	播種前（育苗箱土壌混和）	1									a				

○水稻（殺菌剤（箱施用剤を除く））

FRAC コード	有効成分名	薬剤名	希釈倍数・使用量	使用時期	使用 回数	稲 こ う じ 病	い も ち 病	疑 似 紋 枯 症	ご ま 葉 枯 病 ／ 種 子 消 毒	穂 枯 れ ／ ご ま 葉 枯 病 菌	白 葉 枯 病	墨 黒 穂 病	苗 立 枯 細 菌 病	苗 立 枯 病	ば か 苗 病	も み 枯 細 菌 病	紋 枯 病	備 考
U18	バリダマイシン	バリダシン液剤5	1000倍	収穫14日前まで	5												○	
U18	バリダマイシン	バリダシン粉剤DL	3～4kg/10a	収穫14日前まで	5												○	
U18	バリダマイシン	バリダシンエアー	無人ヘリコプター 8倍, 800mL/10a	収穫14日前まで	5												○	
M1	塩基性硫酸銅	Zボルドー粉剤DL	3～4kg/10a	出穂10日前まで	-	○												
M5	TPN	ダコニール1000	500倍, 500mL/箱	播種時～緑化期 ただし播種14日後まで	2									d				
			1000倍, 1L/箱											d				
32/4	ヒドロキシイソキサゾール／メタラキシルM	タチガレエースM液剤	500倍, 500mL/箱	播種時又は発芽後	1									a				
			1000倍, 1L/箱	播種時										a				
32/4	ヒドロキシイソキサゾール／メタラキシルM	タチガレエースM粉剤	6～8g/箱	播種前（育苗箱土壌混和）	1									a				
1/M5	ベノミル／TPN	ダコレート水和剤	500倍, 500mL/箱	播種時～緑化期 ただし播種14日後まで	2									e				
			1000倍, 1L/箱											e				
3/M1	イブコナゾール／水酸化第二銅	テクリードCFフロアブル	20倍	浸種前（10分間種子浸漬）	1		○		○				○	e	○	○		
			200倍	浸種前（24時間種子浸漬）			○		○				○	e	○	○		
			7.5倍（使用量は乾燥種籾1kg当 たり希釈液30mL）	浸種前（種子吹き付け処理（種子消毒機使用） 又は塗沫処理）			○		○				○	e	○	○		

○水稻（殺菌剤（箱施用剤を除く））

FRAC コード	有効成分名	薬剤名	希釈倍数・使用量	使用時期	使用 回数	稲 こ う じ 病	い も ち 病	疑 似 紋 枯 症	ご ま 葉 枯 病 ／ 種 子 消 毒	穂 枯 れ ／ ご ま 葉 枯 病 菌	白 葉 枯 病	墨 黒 穂 病	苗 立 枯 細 菌 病	苗 立 枯 病	ば か 苗 病	も み 枯 細 菌 病	紋 枯 病	備 考
16. 1/U14	トリシクラゾール／フェリムゾン	ノンプラスフロアブル	1000倍	収穫7日前まで	2		○											
			ブームスプレイヤー 300倍, 25L/10a				○											
			無人ヘリコプター 8倍, 0. 8L/10a				○											
16. 1/U14	トリシクラゾール／フェリムゾン	ノンプラス粉剤D L	3～4kg/10a	収穫7日前まで	2		○			○								
U14/16. 1	フェリムゾン／フサライド	ブラシンフロアブル	1000倍, 60～150L/10a	収穫7日前まで	2		○			○							○	
			ブームスプレイヤー 300倍, 25L/10a				○											
U14/16. 1	フェリムゾン／フサライド	ブラシン粉剤D L	3～4kg/10a	収穫7日前まで	2		○			○								
U18/U14 /16. 1	バリダマイシン／フェリムゾン／フ サライド	ブラシンバリダ粉剤D L	3～4kg/10a	収穫14日前まで	2		○			○							○	
M1/12/3	塩基性塩化銅／フルジオキシニル／ ペフラゾエート	モミガードC水和剤	200倍	浸種前（24時間種子浸漬）	1		○		○				○	f		○	○	
			7. 5倍（使用量は乾燥種粃1kg当 たり希釈液30mL）	浸種前（種子吹き付け処理（種子消毒機使用） 又は塗沫処理）			○		○				○	f		○	○	
			乾燥種粃重量の0. 5%	浸種前（種子湿粉衣）			○		○				○	f		○	○	
M1/12/3	塩基性塩化銅／フルジオキシニル／ ペフラゾエート	モミガードC・D F	200倍	浸種前（24時間種子浸漬）	1		○		○				○			○	○	
			7. 5倍（使用量は乾燥種粃1kg当 たり希釈液30mL）	浸種前（種子吹き付け処理（種子消毒機使用） 又は塗沫処理）			○		○				○			○	○	
U14/16. 1	フェリムゾン／フサライド	ブラシンフロアブル	無人航空機 8倍 0. 8L/10a	収穫7日前まで			○											

注 1）①は疑似紋枯症（赤色菌核病菌，褐色菌核病菌）での登録を示す。
注 2）②は疑似紋枯症（褐色紋枯病菌，赤色菌核病菌，灰色菌核病菌，褐色菌核病菌）での登録を示す。
注 3）③は疑似紋枯症（赤色菌核病菌，褐色菌核病菌，褐色紋枯病菌）での登録を示す。
注 4）苗立枯病 a：ピシウム・フザリウム，b：トリコデルマ，c：ピシウム，d：リゾプス，e：リゾプス・トリコデルマ，f：リゾプス・トリコデルマ・フザリウム
注 5）同名の剤であっても農薬会社によっては登録内容が異なることもあるので，使用する際は農薬の容器（袋）のラベルを確認する。