

(3) 農薬の使用法

○だいず(殺菌剤)

FRAC コード	有効成分名	薬剤名	希釈倍数・使用量	使用時期	使用 回数	茎 疫 病	黒 根 腐 病	紫 斑 病	べ と 病	炭 疽 病	備 考
1	チオファネートメチル	トップジンM水和剤	種子重量の0.5%	播種前(種子粉衣)	1			○			
			700～1500倍	収穫14日前まで	4			○			
1	チオファネートメチル	トップジンM粉剤DL	4kg/10a	収穫14日前まで	4			○			
1	ベノミル	ベンレート水和剤	1000～2000倍	収穫前日まで	4			○			
			乾燥種子重量の0.5%	播種前(種子粉衣)	1		○				
21	シアゾファミド	ランマンフロアブル	1000～2000倍	収穫7日前まで	3	○			○		
			種子重量の1～2%(原液)	播種前(種子塗沫)	1	○					
3	ジフェノコナゾール	ブランドム乳剤25	3000～5000倍	開花後～収穫7日前まで	2			○			
			無人ヘリコプター 16～24倍、0.8L/10a	開花後～収穫7日前まで	2			○			
3	シメコナゾール	サンリット水和剤	1000～2000倍	収穫14日前まで	2			○			
M1	塩基性硫酸銅32	Zボルドー	500倍	－	－			○			
M3	チウラム	キヒゲン	乾燥種子重量の1%	播種前(種子粉衣)	1			○			
M3	チウラム	キヒゲンR-2フロアブル	乾燥種子1kg当たり原液20mL	播種前(塗沫処理)	1			○			
10/1	ジェトフェンカルブ/チオファネートメチル	ゲッター水和剤	乾燥種子重量の0.5%	播種前(種子粉衣)	1			○			
			1000倍	収穫14日前まで	3			○			
10/1	ジェトフェンカルブ/ベノミル	ニマイバー水和剤	1000～2000倍	収穫14日前まで	4			○			
			無人航空機 8～16倍、0.8L/10a	収穫14日前まで	4			○			●無人航空機による散布を追加
27/11	シモキサニル/ファモキサドン	ホライズンドライフロアブル	2500倍	収穫7日前まで	3				○		
27/40	シモキサニル/ベンチアバリカルブイソプロピル	ベトファイター顆粒水和剤	2000～3000倍	収穫7日前まで	2				○		
M1/-	硫酸銅/生石灰	4-8式ボルドー液	※IX参考資料7を参照	－	－			○		○	
M3/1	チウラム/チオファネートメチル	ホーマイ水和剤	種子重量の0.5%	播種前(種子粉衣)	1			○			
M3/1	チウラム/ベノミル	ベンレートT水和剤20	乾燥種子重量の0.2～0.4%	播種前(種子粉衣)	1			○			
U16	テブフロキン	トライフロアブル	1000倍	収穫14日前まで	2			○			
			無人航空機8倍 0.8L/10a、16倍 1.6L/10a	収穫14日前まで	2			○			
M03	マンゼブ	ジマンダイセン水和剤	400～600倍	収穫45日前まで	3			○			
			無人航空機5倍、1.6L/10a	収穫45日前まで	3			○			
M03	マンゼブ	ペンコゼブ水和剤	400～600倍	収穫45日前まで	3			○			
53(B7)	ピリダクロメチル	フセキフロアブル	3000～4000倍	収穫前日まで	3			○			
			無人航空機24～32倍、0.8L/10a	収穫前日まで	3			○			

注) 同名の剤であっても農業会社によっては登録内容が異なることもあるので、使用する際は農薬の容器(袋)のラベルを確認する。