

○だいず（殺虫剤）

[illegible]

○だいず（殺虫剤）

[illegible]

○だいず（殺虫剤）

IRAC コード	有効成分名	薬剤名	希釈倍数・使用量	使用時期	使用 回数	ア ブ ラ ム シ 類	ジ ャ ガ イ モ ヒ ゲ ナ ガ ア ブ ラ ム シ	ウ コ ン ノ メ イ ガ	オ オ タ バ コ ガ	カ メ ム シ 類	コ ガ ネ ム シ 類	ダイズサヤタマバエ	タネバエ	ツメクサガ	ネキリムシ類	ハダニ類	フタスジヒメハムシ	マメシムシ類	マメヒメサヤムシガ	備考
28/15	シアントラニプロール/ ルフェヌロン	ミネクトエクストラSC	10000倍	収穫7日前まで	2													○		
			無人航空機 40～80倍、0.8L/10a	収穫7日前まで	2													○		
28	フルベンジアミド	フェニックスフロアブル	4000倍	収穫7日前まで	3			○	○					○						・希釈倍数使用量「4000倍」のみ採用
			無人航空機 16～32倍、0.8L/10a	収穫7日前まで	3			○	○					○						・希釈倍数使用量「16～32倍」のみ採用
28	フルベンジアミド	フェニックス顆粒水和剤	2000倍	収穫7日前まで	3													○		
28	テトラニプロール	ヨーバルフロアブル	5000倍	収穫7日前まで	2			○						○				○		
			無人航空機 50倍、1.6L/10a	収穫7日前まで	2			○						○				○		
29	フロニカミド	ウララDF	2000～4000倍	収穫7日前まで	2		②													
30	フルキサメタミド	グレーシア乳剤	2000倍	収穫14日前まで	2												○			・フタスジヒメハムシに限り希釈倍数使用量「2000倍」のみ採用
			2000～3000倍	収穫14日前まで	2			○	○									○		
30	プロフラニリド	プロフレアSC	2000倍	収穫前日まで	3			○	○					○				○		
			無人航空機 16～32倍、0.8～1.6L/10a	収穫前日まで	3			○	○					○				○		
UN	ピリダリル	プレオフロアブル	1000～2000倍	収穫7日前まで	2													○		・使用方法「散布」のみ採用 ・希釈倍数使用量「1000～2000倍」のみ採用
3A/1B	フェンバレーレート/MEP	パーマチオン水和剤	1000倍	収穫21日前まで	3							○							○	
			1000～2000倍	収穫21日前まで	3					○									○	
3A/4A	エトフェンプロックス/ジノテフラン	トレボンスター粉剤DL	3～4kg/10a	収穫14日前まで	2												○			

注）同名の剤であっても農業会社によっては登録内容が異なることもあるので、使用する際は農薬の容器（袋）のラベルを確認する。