

○だいず（殺菌殺虫剤）

IRAC/FRAC コード	有効成分名	薬剤名	使用量・希釈倍率	使用時期・収穫前日数	使用 回数	茎 疫 病	黒 根 腐 病	紫 斑 病	ア ブ ラ ム シ 類	カ メ ム シ 類	ダイズサヤタマバエ	タネバエ	ネキリムシ類	フタスジヒメハムシ	マメシンクイガ	備考
I:1B/F:1	MEP／チオファネートメチル	スミトップM粉剤	3～4kg/10a	開花期～若莢期 （ただし収穫21日前まで）	4			○		○	○				○	
I:1B/F:M5	MEP／TPN	スミチオンダコニール粉剤DL	3～4kg/10a	収穫21日前まで	2			○		○					○	
I:4A/F:12 /F:4	チアメトキサム／フルジオキシニル ／メタラキシルM	クルーザーMAXX	乾燥種子1kg当たり原液8mL	播種前（塗沫処理）	1	○	○	○	○			○	○	○		
I:3A/F:U16（ U）	エトフェンブロックス/テブフロキン	トライトレボン粉剤DL	3～4kg/10a	収穫14日前まで	2			○		○					○	

注1）IRAC/FRACコード欄の「I:」は殺虫剤のIRACコード，「F:」は殺菌剤のFRACコードを示す。
注2）同名の剤であっても農薬会社によっては登録内容が異なることもあるので，使用する際は農薬の容器（袋）のラベルを確認する。