

(2) 農薬の使用方法

○キャベツ(殺菌剤)

FRAC コード	有効成分名	薬剤名	菌核病	黒斑細菌病	黒腐病	軟腐病	根こぶ病	べと病	備考
31	オキシリニック酸	スターナ水和剤				○			●軟腐病のみ採用
1	ベノミル	ベンレート水和剤	○						●菌核病のみ採用
21	アミスルブロム	オラクル顆粒水和剤					○		●使用方法「全面土壌混和」のみ採用
21	アミスルブロム	オラクル粉剤					○		●使用方法「全面土壌混和」のみ採用
21	シアゾファミド	ランマンフロアブル					○		●使用方法「灌注」のみ採用 ●根こぶ病のみ採用
29	フルアジナム	フロンサイド粉剤					○		●使用方法「全面土壌混和」のみ採用
2	イブロジオン	ロブラール水和剤	○						●菌核病のみ採用
36	フルスルファミド	ネビジン粉剤					○		●根こぶ病のみ採用
U18	バリダマイシン	バリダシン液剤5			○	○			●黒腐病、軟腐病のみ採用
M1	ノニルフェノールスルホン酸銅	ヨネボン水和剤			○	○			●黒腐病、軟腐病のみ採用
M3, I:UN	マンゼブ	ジマンダイセン水和剤						○	
M5	T P N	ダコソイル					○		
M5	T P N	ダコニール1000						○	●べと病のみ採用
31/24	オキシリニック酸／カスガマイシン	カセット水和剤		○	○	○			
25/M1	ストレプトマイシン硫酸塩／有機銅	ドーマイシン水和剤			○				