

## ねぎ

### (1) 耕種的防除法等

病虫害名	防除適期	防 除 方 法
黒腐菌核病	植付前 定植時	<ul style="list-style-type: none"><li>○ 連作をしない。</li><li>○ 発病畑では、4～5年間他作物の輪作を行う。</li><li>○ 無病苗を選んで定植する。</li></ul>
黒 斑 病	生育中	<ul style="list-style-type: none"><li>○ 肥料切れにならないように注意する。</li></ul>
さ び 病	植付前 生育中	<ul style="list-style-type: none"><li>○ 堆肥、石灰を十分に施用する。</li><li>○ 肥料切れにならないように注意する。</li></ul>
軟 腐 病	生育中 収穫前 収穫後	<ul style="list-style-type: none"><li>○ 雨天の日に収穫すると発病が多くなるので、晴天の日を選んで収穫する。</li><li>○ 貯蔵場所は、低温、乾燥した場所を選ぶ。</li><li>○ 夏期の直射日光に当たる場所には貯蔵しない。</li></ul>
べ と 病	植付前  生育中	<ul style="list-style-type: none"><li>○ 連作をしない。</li><li>○ 発病畑では、3～4年間他作物の輪作を行う。</li><li>○ 排水、風通しのよい畑地を選ぶ。</li><li>○ 早期に罹病株を抜き取るとその後の発病を少なくするので効果が高い。</li></ul>