

ばれいしょ
(1) 耕種的防除法等

病 害 虫 名	防 除 適 期	防 除 方 法
疫 病	植付前 堀取時 堀取後	○ 無病の種いもを植付ける。 ○ 窒素肥料を多用しない。 ○ 堀取は、天気の良い日を選んで行う。 ○ 被害茎葉を集めて焼却する。
黒あざ病	植付時	○ 無病の種いもを植付ける。 ○ 連作をしない。 ○ 石灰などを施用して土壌酸度を矯正する。
そうか病	植付時	○ 無病の種いもを植付ける。 ○ 連作をしない。 ○ 石灰やアルカリ性肥料を使用しない。（石灰を使用する場合は前作に使用する）
炭 疽 病	植付時	○ 無病種いもを選ぶ。 ○ 病株を処分する。 ○ 発病地は3年以上他作物を作付ける。
軟 腐 病	植付前 堀取後～貯蔵時	○ 連作をしない。 ○ 排水に注意し、高畝栽培する。 ○ 窒素肥料を多用しない。 ○ 堀取の際は傷をつけないように注意し、無傷のものだけを貯蔵する。
モザイク病	植付時 植付後	○ 種いもは、毎年更新し、優秀なものを植付ける。（農林水産省植物防疫所発行の検査合格書が添付されたものなど） ○ 発病株は、早期に抜き取って焼却する。 ○ 媒介昆虫のアブラムシの発生に注意する。