

(2) 水稲用除草剤の使用法 イ 使用方法

作物名	区分	薬 剤 名		本剤の使用回数	成分毎の使用回数	HRACコード	希釈倍数・10a当たり使用量/散布流量	使用時期		適 用 雑 草 ※1														その他 (その他の適用雑草・ 適用直播様式 等)	処理方法				
								除草効果・薬害に基づく使用時期	作物残留試験に基づく使用期限	一年生雑草		多年生雑草										表層剥離	田 橋・播種 同時処理		水口施用	周縁散布	無人航空機		
										ノビエ	広葉その他	マツバイ	ホタルイ	ヘラオモダカ	ミズガヤツリ	ウリカワ	ヒルムシロ	セリ	オモダカ	クログワイ	コウキヤガラ							シズイ	
移植水稲	耕起前	タッチダウン i Q		1	2	9	250～500mL/25～100L	耕起前(雑草生育期:草丈30cm以下)													一年生雑草								
移植水稲	刈跡・耕起前	ブリグロックス L		1	1/2	22/22	800～1000mL/100～150L	秋期稲刈取後又は春期水田耕起1ヶ月前から直前まで													一年生雑草								
移植水稲	耕起前	ラウンドアップマックスロード		2	2	9	200～500mL/50～100L (通常散布)	耕起前(雑草生育期)													一年生雑草、多年生広葉雑草								
移植水稲				500mL/5～25L (少量散布)	耕起前(雑草生育期)																多年生(イ科)雑草								
移植水稲	耕起前	草枯らし M I C		1	2	9	250～500mL/100L	耕起20～10日前(雑草生育)													一年生雑草								
移植水稲				250～500mL/50L	湛水前30～5日前(雑草生育)																一年生雑草								
移植水稲				500～1000mL/50L	期)(不耕起栽培)																	多年生雑草							
移植水稲	育苗箱	クリンチャー E W		1	3	1	1000倍/育苗箱(30×60cm)当り18mL	播種後10日～15葉期		○5																			
移植水稲	初期	エリジャンジャンボ		1	2	15	小包装(ﾊﾟｯｸ)10個(300g)/10a	植代後～移植前7日		○1	○	○	○始	○始	○始							SURｽﾀｲ※、ｽﾞﾌﾞｲ※							
移植水稲				移植直後～15葉期	移植後30日まで	○	○	○	○始	○始	○始																		
移植水稲	初期	エリジャン乳剤		1	2	15	300mL	植代後～移植7日前まで		○1	○	○	○始	○前	○前							雑草(イ前)※							
移植水稲				移植直後～15葉期	移植後30日まで	○	○	○	○	○																			
移植水稲	初期	兆 1 キロ粒剤		1	2	14	1kg	植代後～移植7日前又は移植直後～15葉期	移植後30日まで	○1.5	○	○	○始	○始		○始	○発	○前始	○前	○前		クサネム 1				○			
移植水稲				移植時		○	○	○	○	○		○	○		○	○	○												
移植水稲	初期	兆ジャンボ		1	2	14	小包装(ﾊﾟｯｸ)10個(300g)	移植直後～15葉期	移植後30日まで	○1.5	○	○	○始	○始		○始	○発												
移植水稲	初期	兆フロアブル		1	2	14	500mL	植代後～移植7日前又は移植直後～15葉期	移植後30日まで	○1.5	○	○	○始	○始		○始	○発	○始	○前	○前			○						
移植水稲				移植時		○	○	○	○	○		○	○		○	○	○												
移植水稲	初期	草苗フロアブル		1	2/2	0/14	500mL	植代後～移植前7日又は移植直後～15葉期	移植後30日まで	○1	○	○	○前始	○前始	○前始														
移植水稲								移植時		○	○	○	○	○	○														
移植水稲								植代時(移植前7日まで)		○	○	○	○	○	○														
移植水稲							植代後～移植前7日又は移植直後～15葉期	移植後30日まで	○	○	○	○前始		○前始				○前	○前始	○前									
移植水稲							移植時		○	○	○	○	○		○	○	○		○	○	○								
移植水稲	初期	サキドリ E W		1	2/2	15/14	500mL	植代後～移植前7日又は移植直後～15葉期	移植後30日まで	○1	○	○	○始	○前	○始			○前	○前										
移植水稲								移植時		○	○	○	○	○	○			○	○										
移植水稲								植代時(移植7日前まで)		○	○	○	○	○	○			○	○										
移植水稲	初期	ショキニーフロアブル		1	2/2	0/14	500mL	移植直後～15葉期	移植後30日まで	○1	○	○	○始	○始	○前			○前						○					
移植水稲								移植時		○	○	○	○	○	○			○											
移植水稲	初期	シンウチ E W		1	2/2	15/14	500mL	植代後～移植前7日又は移植直後～15葉期	移植後30日まで	○1	○	○	○始	○前	○始			○前	○前					○					
移植水稲								移植時		○	○	○	○	○	○			○	○										
移植水稲								植代時(移植7日前まで)		○	○	○	○	○	○			○	○										
移植水稲								植代後～移植7日前又は移植当日～15葉期	移植後30日まで	○1	○	○																	
移植水稲	初期	ソルネット 1 キロ粒剤		1	2	15	1kg	植代後～移植前7日		○1	○	○	○始	○始	○始														
移植水稲								移植直後～15葉期	移植後30日まで	○	○	○	○	○	○														
移植水稲								移植時		○	○	○	○	○	○														
移植水稲								植代時(移植4日前まで)		○前	○	○	○前	○前	○前											雑草(イ前)※			
移植水稲	初期	デルカット乳剤		1	1/2	14/15	250～350mL (少量散布)	植代時(移植4日前まで)		○前	○	○	○前	○前	○前				○前	*前									
移植水稲	初期	バレージ粒剤		1	2/2	5/15	3kg	移植後3日～10日(15葉期まで)		○1.5	○	○	○始	○始	○始						○前								
移植水稲	初期	ピラクロン 1 キロ粒剤		1	2	14	1kg	植代後～移植7日前又は移植直後～15葉期	移植後30日まで	○1.5	○	○	○始	○始		○始	○発	○前始	○前	○前		クサネム 1				○			
移植水稲								移植時		○	○	○	○	○		○	○	○	○	○									

作物名	区分	薬剤名		本剤の使用回数	成分毎の使用回数	HRACコード	希釈倍数・10a当たり使用量/散布流量	使用時期		適用雑草※1																その他 (その他の適用雑草・適用直播様式等)	処理方法						
										一年生雑草		多年生雑草															田植・播種 同時処理	水口施用	周縁散布	無人航空機			
								除草効果・薬害に基づく使用時期	作物残留試験に基づく使用期限	ノビエ	広葉その他	マツパイ	ホタルイ	ヘラオモダカ	ミズガヤツリ	ウリカワ	ヒルムシロ	セリ	オモダカ	クログワイ	コウキヤガラ	シズイ	表層剥離										
移植水稻	初期	ピラクロンジャンボ		1	2	14	小包装(ﾊﾞｯｸ)10個(300g)	移植直後～ﾊﾞｲ 11.5葉期	移植後30日まで	○1.5	○	○	○始	○始		○始								ｽｽﾞﾌｧｲ※									
移植水稻	初期	ピラクロンフロアブル		1	2	14	500mL	植代後～移植7日前又は移植直後～ﾊﾞｲ 11.5葉期	移植後30日まで	○1.5	○	○	○始	○始		○始	○発		○始	○前	○前							○					
移植水稻								移植時		○	○	○	○	○		○	○		○	○	○							○					
移植水稻	初期	ベクサー1キロ粒剤		2	2	14	1kg	植代後～移植前7日又は移植直後～ﾊﾞｲ 1発生始期	移植後30日まで	○始	○	○																○					
移植水稻								移植時		○	○	○																	○				
移植水稻	初期	ベクサーフロアブル		2	2	14	500mL	植代後～移植前7日又は移植直後～ﾊﾞｲ 1発生始期	移植後30日まで	○始	○	○																	○				
移植水稻								移植時		○	○	○																		○			
移植水稻	初期	マーシェット1キロ粒剤		1	2	15	1kg	植代後～移植前7日又は移植直後～ﾊﾞｲ 11葉期	移植後30日まで	○1	○	○	○始	○前	○始																		
移植水稻								移植時		○	○	○	○	○	○															○			
移植水稻	初期	マーシェットジャンボ		1	2	15	小包装(ﾊﾞｯｸ)10個(500g)	植代後～移植前7日又は移植後1日～ﾊﾞｲ 11葉期	移植後30日まで	○1	○	○	○始	○前	○始																		
移植水稻	初期	マーシェット乳剤		1	2	15	300～500mL	植代直後(移植7日前まで)又は移植後1日～ﾊﾞｲ 11葉期	移植後30日まで	○1	○	○	○始	○始	○前																		
移植水稻	初期	メテオジャンボ		1	2	14	小包装(ﾊﾞｯｸ)10個(300g)	移植直後～ﾊﾞｲ 11葉期	移植後30日まで	○1	○	○	○始											ｽｽﾞﾌｧｲ※				○					
移植水稻	初期	メテオフロアブル		2	2	14	500mL	植代後～移植前7日又は移植直後～ﾊﾞｲ 11葉期	移植後30日まで	○1	○	○	○始							○前				雑草1日前～始(鞘葉抽出期)※、ｽｽﾞﾌｧｲ※				○					
移植水稻								移植時		○	○	○	○							○									○				
移植水稻	初期	ユニハープフロアブル		1	2/2	15/27	500mL	植代時(移植7日前まで)		○1	○	○	○	○	○	○			○														
移植水稻								植代後～移植7日前まで		○	○	○	○	○	○	○	○			○													
移植水稻								移植直後～ﾊﾞｲ 11葉期	移植後30日まで	○	○	○	○	○	○	○	○			○										○			○
移植水稻								移植時		○	○	○	○	○	○	○	○			○										○			
移植水稻	初期一	クサトッタ1キロ粒剤		1	2/2/2	5/27/15/0	1kg	移植直後～ﾊﾞｲ 12葉期	移植後30日まで	○2	○	○	○2	○始	○2	○2	○発	○始					○前	イボクサ：再生始※									
移植水稻								移植時		○	○	○	○	○	○	○	○	○					○						○				
移植水稻	初期一	クサトッタ粒剤		1	2/2/2	5/27/15/0	3kg	移植直後～ﾊﾞｲ 12葉期	移植後30日まで	○2	○2	○2	○2	○始	○2	○2	○発					○始	ｽｽﾞﾌｧｲ※										
移植水稻								移植時		○	○	○	○	○	○	○	○						○						○				
移植水稻	初期一	スラッシュ1キロ粒剤		1	2/2/2	5/27/15/0	1kg	移植直後～ﾊﾞｲ 12葉期	移植後30日まで	○2	○	○	○2	○始	○2	○2	○発	○始					○前	イボクサ：再生始※									
移植水稻								移植時		○	○	○	○	○	○	○	○						○						○				
移植水稻	初期一	スラッシュ粒剤		1	2/2/2	5/27/15/0	3kg	移植直後～ﾊﾞｲ 12葉期	移植後30日まで	○2	○	○	○2	○始	○2	○2	○発					○始	ｽｽﾞﾌｧｲ※										
移植水稻								移植時		○	○	○	○	○	○	○	○						○						○				
移植水稻	初中期	アールタイプ1キロ粒剤		1	2/3/2	27/27/2	1kg	移植直後～ﾊﾞｲ 12.5葉期	移植後30日まで	○2.5	○	○	○2	○2	○2	○2	○発	○前始	○前始	○前始	*始	○3cm	*前	コギ 始、ｽｽﾞﾌｧｲ※								○	
移植水稻								移植時		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	*						○				
移植水稻	初中期	アールタイプジャンボ		1	2/3/2	27/27/2	小包装(ﾊﾞｯｸ)10個(400g)	移植後3日～ﾊﾞｲ 12.5葉期	移植後30日まで	○2.5	○	○	○2	○2	○2	○始	○発	○前始	○前始	○前始	*始	○3cm											
移植水稻	初中期	アールタイプフロアブル		1	2/3/2	27/27/2	500mL	移植後3日～ﾊﾞｲ 12.5葉期	移植後30日まで	○2.5	○	○	○2	○始	○2	○始	○発	○前始	○前始*	○前始	○始*	○3cm	*前					○			○		
移植水稻	初中期	アカツキジャンボ	ﾌｧﾝｷﾞｻｽｷﾝ 8.0% ﾌｧﾝｷ/ﾄﾘﾅﾝ 12.0% ﾔｸﾞｼﾞ ｽﾔﾌﾞﾝ 4.0%	1	2/2/2		小包装(ﾊﾞｯｸ)10個(250g)	移植後3日～ﾊﾞｲ 13葉期	収穫60日前まで	○3.5	○	○	○3	○3	○10cm	○始	○発	○再												○砂壤土除く			
移植水稻			ﾌｧﾝｷﾞｻｽｷﾝ 8.0% ﾌｧﾝｷ/ﾄﾘﾅﾝ 12.0% ﾔｸﾞｼﾞ ｽﾔﾌﾞﾝ 4.0%	1	2/2/2		250g	移植後3日～ﾊﾞｲ 13葉期	収穫60日前まで	○3.5	○	○	○3	○3	○10cm	○始	○発	○再												○砂壤土除く			
移植水稻	初中期	アクシズM X 1キロ粒剤		1	2/2/2	2/27/2	1kg	移植後7日～ﾊﾞｲ 14葉期	収穫45日前まで	○4	○	○	○4	○3	○4	○3	○発	○前始	○始～矢尻1	○始～10cm	*始～10cm	○10cm		ｽｽﾞﾌｧｲ※								○	
移植水稻	初中期	アシュラ1キロ粒剤	ﾄﾘﾌｱﾓﾝ0.5%、ﾋﾞﾗｸﾛﾆ2%、ﾊﾞﾝｼﾞｼｸﾛ2%	1	4/14/27	2/27/2	1kg	移植直後～ﾊﾞｲ 14葉期	移植後30日まで	○4	○	○	○4	○4	○15cm	○3	○発	○前始	○始	○始	*始～10cm		*始	コギ 2、オモダカ・クログワイ・コササグは体系処理で使用する。									
移植水稻								移植時		○	○	○	○	○	○	○	○	○											○				
移植水稻	初中期	アッパレZ 1キロ粒剤		1	2/2/2	14/2/0	1kg	移植時		○3	○	○	○3	○3	○4	○2	○発	○前始	○前始	○前始S	○始	○3cm	*始	エノネチヌチグサ※、コギ 2、ｽｽﾞﾌｧｲ※					○				
移植水稻								移植直後～ﾊﾞｲ 13葉期	移植後30日まで	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	エノネチヌチグサ※								

作物名	区分	薬剤名		本剤の使用回数	成分毎の使用回数	HRACコード	希釈倍数・10a当たり使用量/散布量	使用時期		適用雑草※1														その他 (その他の適用雑草・適用直播様式等)	処理方法				
										一年生雑草		多年生雑草										表層剥離			同時処理	田植・播種	水口施用	周縁散布	無人航空機
								除草効果・薬害に基づく使用時期	作物残留試験に基づく使用期限	ノビエ	広葉その他	マツパイ	ホタルイ	ヘラオモダカ	ミズガヤツリ	ウリカワ	ヒルムシロ	セリ	オモダカ	クログワイ	コウキヤガラ	シズイ							
移植水稻	初中期	アツバレZジャンボ		1	2/2/2	14/2/0	小包装(ﾊﾞｯｸ)10個(400g)	移植後3日～ﾊﾞｲ13葉期	移植後30日まで	○3	○	○	○3	○3	○3	○2	○発	*前始	○前始	○前S	○始	○3cm	*始	ｲﾝﾉﾎﾞｽﾀｸﾞ ﾏｻ, ﾐｽﾞｱｲｻ					
移植水稻	初中期	アツバレZフロアブル		1	2/2/2	14/2/0	500mL	移植後3日～ﾊﾞｲ13葉期	移植後30日まで	○3	○	○	○3	○3	○4	○2	○発	○前始	○前始	*前始S	○始	○3cm	*前	ｲﾝﾉﾎﾞｽﾀｸﾞ ﾏｻ, ﾐｽﾞｱｲｻ		○			
移植水稻	初中期	イッテツ1キロ粒剤		1	2/1/3	2/15/27	1kg	移植後5日～ﾊﾞｲ12.5葉期	移植後30日まで	○2.5	○	○	○2	○2	○2	○2	○発	○始	○始	○始	○始	○3cm	○前	ﾐｽﾞｱｲ1※					
移植水稻	初中期	イッテツジャンボ		1	2/1/3	2/15/27	小包装(ﾊﾞｯｸ)10個(400g)	移植後5日～ﾊﾞｲ12.5葉期	移植後30日まで	○2.5	○	○	○2	○2	○2	○始	○発	○始	○始	○始		○3cm	○前	ﾐｽﾞｱｲ1※					
移植水稻	初中期	イッテツフロアブル		1	2/1/3	2/15/27	500mL	移植後5日～ﾊﾞｲ12.5葉期	移植後30日まで	○2.5	○	○	○2	○2	○2	○2	○発	○始	○始	○始	○始	○3cm	○前	SURﾎﾙﾂｲ2※, ﾐｽﾞｱｲ1*		○		○	
移植水稻	初中期	イッポン1キロ粒剤75		1	2/2/2	14/0/2	1kg	移植直後～ﾊﾞｲ12.5葉期	移植後30日まで	○2.5	○	○	○2	○2	○2	○2	○発	○始	○始	○始	○始	○3cm	○前	ｲﾝﾉﾎﾞｽﾀｸﾞ ﾏｻ					○
移植水稻								移植時		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
移植水稻	初中期	イッポンジャンボ		1	2/2/2	14/0/2	小包装(ﾊﾞｯｸ)10個(500g)	移植直後～ﾊﾞｲ12.5葉期	移植後30日まで	○2.5	○	○	○2	○2	○2	○始	○発	○始	○始	○始		○3cm	○前						
移植水稻	初中期	イッポンフロアブル		1	2/2/2	14/0/2	500mL	移植直後～ﾊﾞｲ12.5葉期	移植後30日まで	○2.5	○	○	○2	○2	○2	○2	○発	○始	○始	○始	○始	○3cm	○前			○		○	
移植水稻								移植時		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
移植水稻	初中期	イネキング1キロ粒剤		1	2/2/3	14/27/27	1kg	移植直後～ﾊﾞｲ12.5葉期	移植後30日まで	○2.5	○	○	○2	○2	○2	○始	○発		○前始	○始			○前	ﾐｽﾞｱｲ1*					○
移植水稻								移植時		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
移植水稻	初中期	イネキングジャンボ		1	2/2/3	14/27/27	小包装(ﾊﾞｯｸ)10個(500g)	移植後1日～ﾊﾞｲ12.5葉期	移植後30日まで	○2.5	○	○	○2	○2	○2	○始	○発		○前始	○前始			○前	ﾐｽﾞｱｲｻ					
移植水稻	初中期	イネキングフロアブル		1	2/2/3	14/27/27	500mL	移植直後～ﾊﾞｲ12.5葉期	移植後30日まで	○2.5	○	○	○2	○2	○2	○2	○発		○始	○始				ﾐｽﾞｱｲ1*					○
移植水稻								移植時		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
移植水稻	初中期	イネリーグジャンボ	ｸﾛｽﾞ ﾛｯﾌﾟ 11.2%,ﾃﾞﾘﾄﾘｵﾝ7.5%,ﾌｧﾝﾄﾗﾞ ﾐﾄﾞ 7.5%	1	4/27/15		小包装(ﾊﾞｯｸ)10個(400g)	移植直後～ﾊﾞｲ12.5葉期	移植後30日まで	○2.5	○	○	○3	○3	○4	○始	○発	*前始	○前始			○3cm		ｸﾞｷ2、ﾎﾞﾀﾞｶ・ｼﾞｻﾞｲは後処理剤との体系で使用する	○	○			
移植水稻	初中期	ウィナー1キロ粒剤75		1	2/2/2	15/0/2	1kg	移植直後～ﾊﾞｲ12.5葉期	移植後30日まで	○2.5	○	○	○2	○2	○2	○始	○発	○前始	○前始	○始		○3cm	○前	ﾐｽﾞｱｲｻ					○
移植水稻								移植時		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
移植水稻	初中期	ウィナージャンボ		1	2/2/2	15/0/2	小包装(ﾊﾞｯｸ)10個(500g)	移植直後～ﾊﾞｲ12.5葉期	移植後30日まで	○2.5	○	○	○2	○始	○2	○始	○発	○前始	○前始	○前始		○3cm	○前	ﾐｽﾞｱｲｻ					
移植水稻	初中期	ウィナーフロアブル		1	2/2/2	15/0/2	500mL	移植直後～ﾊﾞｲ12.5葉期	移植後30日まで	○2.5	○	○	○2	○始	○2	○始	○発	○前始	○前始	○前始		○3cm	○			○			○
移植水稻								移植時		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
移植水稻	初中期	ウルティモZフロアブル	ｼﾌﾛﾋﾞﾘﾓｰﾄ5.5%,ﾋﾞﾗﾞﾌﾞﾚｰﾄ11%,ﾌﾞﾛﾋﾞﾘｽﾙﾌﾛﾝ1.65%	1	33/27/2	15/27/2	500mL	移植後5日～ﾊﾞｲ13葉期	移植後30日まで	○3	○	○	○3	○3	○4	○2	○発	*前始	○前始	○前				ｸﾞｷ2、ｼﾞｻﾞｲは後処理剤との体系で使用する		○			○
移植水稻	初中期	エンペラーフロアブル	ﾋﾞﾗｸﾛﾓﾙ 3.7% ﾋﾞﾘﾐ/ﾊﾞｯｸﾏﾙﾙ 1.4% ﾌｧﾝｷ/ﾄﾘｵﾝ 5.6%	1	2/2/2		500mL	移植直後～ﾊﾞｲ13葉期	移植後30日まで	○3	○	○	○3	○3	○5cm	○2	○発	○前始						ｲﾝﾉﾎﾞｽﾀｸﾞ ﾏｻ	○	○			
移植水稻	初中期	カイリキZジャンボ		1	2/2/2	15/27/2	小包装(ﾊﾞｯｸ)10個(300g)	移植後3日～ﾊﾞｲ13葉期	移植後30日まで	○3	○	○	○3	○2	○15cm	○3	○発	○再	○始	○始	○始					○			
移植水稻	初中期	カイリキZフロアブル		1	2/2/2	15/27/2	500mL	移植後3日～ﾊﾞｲ13葉期	移植後30日まで	○3	○	○	○3		○12cm	○2	○発	○再	○始	○始	○始					○			○
移植水稻	初中期	カウンスルコンブリート1キロ粒剤		1	2/2	27/2	1kg	移植直後～ﾊﾞｲ13.5葉期	移植後30日まで	○3.5	○	○	○3	○3	○3	○2	○発	○前*始	○前～ﾊﾞﾗﾞｰS	○*前10cmS	*始30cmS	○3cm		ｸﾞｻﾈﾑ1※, ｲﾝﾉﾎﾞｽﾀｸﾞ ﾏｻ					○
移植水稻								移植時		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
移植水稻	初中期	カウンスルコンブリートジャンボ		1	2/2	27/2	小包装(ﾊﾞｯｸ)10個(300g)	移植後5日～ﾊﾞｲ13葉期	移植後30日まで	○3	○	○	○3	○4	○4	○2	○発	○前始	前*始S	○前～25cmS	*始25cmS			ﾐｽﾞｱｲ1※					
移植水稻	初中期	カウンスルコンブリートフロアブル		1	2/2	27/2	500mL	移植後5日～ﾊﾞｲ13.5葉期	移植後30日まで	○3.5	○	○	○3	○4	○4	○2	○発	○前始	*前始	○始～10cmS	*始30cmS			ﾐｽﾞｱｲ1※			○		○
移植水稻	初中期	ガンガン1キロ粒剤		1	2/2	2/15	1kg	移植直後～ﾊﾞｲ13葉期	移植後30日まで	○3	○	○	○3	○3	○2	○2	○発	○前始	○始	○前始	*始	○3cm	*前	ｲﾝﾉﾎﾞｽﾀｸﾞ ﾏｻ, ﾐｽﾞｱｲｻ					○
移植水稻								移植時		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
移植水稻	初中期	ガンガンジャンボ		1	2/2	2/15	小包装(ﾊﾞｯｸ)10個(250g)	移植後3日～ﾊﾞｲ12.5葉期	移植後30日まで	○2.5	○	○	○2	○2	○2	○2	○発	○前始	*前始	○前始	*始	○3cm	*前	ﾐｽﾞｱｲ1※					
移植水稻	初中期	キマリテジャンボ		1	2/2	15/27	小包装(ﾊﾞｯｸ)10個(300g)	移植直後～ﾊﾞｲ12.5葉期*	移植後30日まで	○2.5*	○	○	○2	○2	○2	○2	○発	○前始	○前始	*前始		○3cm	*前	ﾐｽﾞｱｲ1※		○			
移植水稻								移植直後～ﾊﾞｲ12.5葉期*	移植後30日まで	○2.5*	○	○	○2	○2	○2	○2	○発	○前	○前始	○前始		○3cm	*前			○			○

作物名	区分	薬剤名		本剤の使用回数	成分毎の使用回数	HRACコード	希釈倍数・10a当たり使用量/散布流量	使用時期		適用雑草※1																その他 (その他の適用雑草・ 適用直播様式等)	処理方法									
										一年生雑草		多年生雑草															表層剥離	藻類・ シズイ	同時処理	田植・播種	水口施用	周縁散布	無人航空機			
								除草効果・薬害に基づく使用時期	作物残留試験に基づく使用期限	ノビエ	広葉その他	マツパイ	ホタルイ	ヘラオモダカ	ミズガヤツリ	ウリカワ	ヒルムシロ	セリ	オモダカ	クログワイ	コウキヤガラ	シズイ														
移植水稻	初中期	キマリテフロアブル		1	2/2	15/27	500mL	移植時		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○							
移植水稻	初中期	銀河1キロ粒剤		1	3/2/2	0/14/2	1kg	移植直後～/ビ13葉期	収穫60日前まで	○3	○	○	○3	○2	○3	○2	○	○	○前始	○前始	○前始	○前始	○前始	○前始	○前始	○前始	○前始	○前始	○前始	○前始	○前始	○前始	○前始	○		
移植水稻								移植時		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
移植水稻	初中期	銀河ジャンボ		1	3/2/2	0/14/2	小包装(ﾊﾞｯｸ)10個(400g)	移植後5日～/ビ13葉期	収穫60日前まで	○3	○	○	○3	○2	○3	○2	○	○	○前始	○前始	○前始	○前始	○前始	○前始	○前始	○前始	○前始	○前始	○前始	○前始	○前始	○前始	○前始	○前始	○前始	
移植水稻	初中期	銀河フロアブル		1	3/2/2	0/14/2	500mL	移植後5日～/ビ13葉期	移植後30日まで	○3	○	○	○3	○2	○2	○2	○	○	○前始	○前始	○前始	○前始	○前始	○前始	○前始	○前始	○前始	○前始	○前始	○前始	○前始	○前始	○前始	○前始	○前始	
移植水稻	初中期	クサバルカンジャンボ		1	2/2/3	14/27/27	小包装(ﾊﾞｯｸ)10個(500g)	移植後1日～/ビ12.5葉期	移植後30日まで	○2.5	○	○	○2	○2	○2	○2	○	○	○前始	○前始	○前始	○前始	○前始	○前始	○前始	○前始	○前始	○前始	○前始	○前始	○前始	○前始	○前始	○前始	○前始	
移植水稻	初中期	クサバルカンフロアブル		1	2/2/3	14/27/27	500mL	移植直後～/ビ12.5葉期	移植後30日まで	○2.5	○	○	○2	○2	○2	○2	○	○	○始	○始	○始	○始	○始	○始	○始	○始	○始	○始	○始	○始	○始	○始	○始	○始	○始	
移植水稻	初中期	ゲットスターフロアブル		1	2/2	27/14	500mL	移植後5日～/ビ12.5葉期	移植後30日まで	○2.5	○	○	○2	○2	○2	○2	○	○	○始	○始	○始	○始	○始	○始	○始	○始	○始	○始	○始	○始	○始	○始	○始	○始	○始	
移植水稻	初中期	コメット1キロ粒剤		1	2/2/2	27/14/2	1kg	移植直後～/ビ12.5葉期	移植後30日まで	○2.5	○	○	○2	○2	○2	○2	○	○	○前始	○前始	○前始	○前始	○前始	○前始	○前始	○前始	○前始	○前始	○前始	○前始	○前始	○前始	○前始	○前始	○前始	
移植水稻								移植時		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
移植水稻	初中期	コメット顆粒		1	2/2/2	27/14/2	80 g /500mL	移植直後～/ビ12.5葉期	移植後30日まで	○2.5	○	○	○2	○2	○2	○2	○	○	○前始	○前始	○前始	○前始	○前始	○前始	○前始	○前始	○前始	○前始	○前始	○前始	○前始	○前始	○前始	○前始	○前始	○前始
移植水稻							80 g	移植時		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
移植水稻								移植直後～/ビ12.5葉期	収穫60日前まで	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
移植水稻	初中期	コメットジャンボ		1	2/2/2	27/14/2	小包装(ﾊﾞｯｸ)10個(300g)	移植後5日～/ビ12.5葉期	移植後30日まで	○2.5	○	○	○2	○2	○2	○2	○	○	○始	○始	○始	○始	○始	○始	○始	○始	○始	○始	○始	○始	○始	○始	○始	○始	○始	○始
移植水稻	初中期	サキガケ案粒	ｲﾌﾞﾌｪｶﾙﾊﾞﾞﾝ 10.0%、ﾌﾞﾗｼﾄﾘｵﾝ 12.0%、ﾌﾞﾛﾋﾞﾌｳｻｷﾌｪﾝﾍﾞﾝｼﾞﾙ 2.0%	1	2/2/2		250g	移植直後～/ビ12.5葉期	移植後30日まで	○2.5	○	○	○2	○始		○始	○	○	○前始	○始														○		
移植水稻	初中期	サラブレッドGO400FG	ｲﾔｼﾞｽﾙ70ﾝ 2.25%/ｷｷｻｼﾞｸﾛﾓﾝ 1.5%/ﾋﾞﾌﾗｸﾛﾆﾑ 2.5%/ﾌﾞﾛﾋﾞﾌﾞ 22.5%	1	2/2/2/2		400g	移植直後～/ビ12.5葉期	移植後30日まで	○2.5	○	○	○2		○10cm	○2	○	○	○再																	
移植水稻	初中期	忍1キロ粒剤		1	2/2/3	2/14/27	1kg	移植直後～/ビ12.5葉期	移植後30日まで	○2.5	○	○	○2	○2	○2	○2	○	○	○前始	○始	○始	○始	○始	○始	○始	○始	○始	○始	○始	○始	○始	○始	○始	○始	○始	
移植水稻								移植時		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
移植水稻	初中期	忍ジャンボ		1	2/2/3	2/14/27	小包装(ﾊﾞｯｸ)10個(200g)	移植直後～/ビ12.5葉期	移植後30日まで	○2.5	○	○	○2	○2	○2	○2	○	○	○始	○始	○始	○始	○始	○始	○始	○始	○始	○始	○始	○始	○始	○始	○始	○始	○始	○始
移植水稻	初中期	忍フロアブル		1	2/2/3	2/14/27	500mL	移植直後～/ビ12.5葉期	移植後30日まで	○2.5	○	○	○2	○始	○2	○始	○	○	○前	○始	○始	○始	○始	○始	○始	○始	○始	○始	○始	○始	○始	○始	○始	○始	○始	
移植水稻								移植時		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
移植水稻	初中期	ジェイフレンドフロアブル		1	2/2/2	0/27/14	500mL	移植後5日～/ビ12.5葉期*	移植後30日まで	○2.5	○	○	○3	○3	○4	○始	○	○	*前始	○前始	○始													○		
移植水稻	初中期	ジャスタフロアブル	ｼｸﾛﾄﾞﾘﾓﾚｰﾄ5.5%/ﾄﾘﾌｱﾌｪﾝ0.9%/ﾋﾞﾌﾞﾗｰﾄ11.0%	1	2/2/2		500mL	移植直後～/ビ13.5葉期	移植後30日まで	○3.5	○	○	○3	○4	○10cm	○3	○	○	○前始															○		
移植水稻	初中期	シュナイデン1キロ粒剤		1	2/3/2	27/27/2	1kg	移植直後～/ビ12.5葉期	移植後30日まで	○2.5	○	○	○2	○2	○2	○2	○	○	○前始	○前始	○前始	*始	○3cm												○	
移植水稻								移植時		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
移植水稻	初中期	シュナイデンジャンボ		1	2/3/2	27/27/2	小包装(ﾊﾞｯｸ)10個(400g)	移植後3日～ノビエ2.5葉期	移植後30日まで	○2.5	○	○	○2	○2	○2	○始	○	○	○前始	*前始	○前始	○始	○3cm													
移植水稻	初中期	シュナイデンフロアブル		1	2/3/2	27/27/2	500mL	移植後3日～/ビ12.5葉期	移植後30日まで	○2.5	○	○	○2	○始	○2	○始	○	○	○前始	*前始	○前始	*始	○3cm												○	
移植水稻	初中期	ストレンクス1キロ粒剤	ﾌﾞﾗｼﾄﾘｵﾝ3.0%/ﾄﾘﾌｱﾌｪﾝ0.50%/ﾌﾞﾛﾋﾞﾌｳｻｷﾌｪﾝﾍﾞﾝｼﾞﾙ0.45%	2	2/2/3		1kg	移植後5日～/ビ14葉期	移植後30日まで	○4	○	○	○4	○5	○20cm	○2	○	○	○再																	
移植水稻	初中期	ゼータタイガージャンボ		1	2/2/2	2/0/14	小包装(ﾊﾞｯｸ)10個(300g)	移植後3日～/ビ13葉期	移植後30日まで	○3	○	○	○3	○3	○4	○2	○	○	*前始	○前始	○前始	*始	○3cm	*前												
移植水稻	初中期	ゼータタイガーフロアブル		1	2/2/2	2/0/14	500mL	移植後3日～/ビ13葉期	移植後30日まで	○3	○	○	○3	○3	○4	○2	○	○	*前始	○前始	○前始	*始	○3cm	*前										○	○	
移植水稻	初中期	ゼータファイヤフロアブル		1	2/2	2/0	500mL	移植後5日～/ビ13葉期	移植後30日まで	○3	○	○	○3	○3	○3	○3	○	○	○始	○始	○始	○始	○3cm	○前												
移植水稻	初中期	ゼータプラス200FG	ﾌｧﾝｷ/ﾄﾘｵﾝ15.0%/ﾌﾞﾛﾄﾞﾘｽｸ70ﾝ4.5%	1	2/2		200g	移植後3日～/ビ14葉期	移植後30日まで	○4	○	○	○3	○4	○15cm	○始	○	○	○前	○前始	○前始	○始														

作物名	区分	薬剤名		本剤の使用回数	成分毎の使用回数	HRACコード	希釈倍数・10a当たり使用量/散布流量	使用時期		適用雑草※1														その他 (その他の適用雑草・ 適用直播様式 等)	処理方法				
								除草効果・薬害 に基づく使用時期	作物残留試験に基 づく使用期限	多年生雑草															田植・播種 同時処理	水口施用	周縁散布	無人航空機	
										ノビエ	広葉 その他	マツパイ	ホタルイ	ヘラオモダカ	ミズガヤツリ	ウリカワ	ヒルムシロ	セリ	オモダカ	クログワイ	コウキヤガラ	シズイ	表層剥離・ 藻類・ 雑草						
移植水稻	初中期	センチチMX1キロ粒剤		1	2/2/2	14/2/27	1kg	移植直後～バ' 13.5葉期	収穫60日前まで	○3.5	○	○	○3	○3	○3	○2	○発	*前	○前始	○始～10cm	○始～10cm	○3cm	*前	イ' /ササガ' サ※、ミ' アイ※				○	
移植水稻	初中期	ダブルスターS B 顆粒		1	1/1/3	2/15/27	80g/500mL、 80g (顆粒水口施用)	移植直後～バ' 12.5葉期	移植後30日まで	○2.5	○	○	○2	○2	○2	○2	○発	○始	○始	○始			○前				○ 顆粒のまま		○
移植水稻							移植時		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○		
移植水稻	初中期	タンポパワー1キロ粒剤		1	2/2/2	14/2/27	1kg	移植直後～バ' 13.5葉期	収穫60日前まで	○3.5	○	○	○3	○3	○3	○2	○発	*前始	○前始	○始～10cm	○始～10cm	○3cm	*前	イ' /ササガ' サ※				○	
移植水稻	初中期	ツルギ250粒剤		1	2/2/3	15/2/27	250g	移植直後～バ' 12.5葉期	移植後30日まで	○2.5	○	○	○2	○2	○10cm	○始	○発	○前始		*始	○3cm			コナ' 1、ミ' アイ※			○	○	○
移植水稻							移植時		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○							
移植水稻	初中期	デオレージャンボ	ササ' クロメ※1%/ツルギ※1%/ミ' ス 470※2.5%	1	2/2/2		40g×10コ	移植後3日～バ' 13葉期	移植後30日まで	○3	○	○	○3	○2	○10cm	○2	○発	○再											
移植水稻	初中期	デルタアタック1キロ粒剤		1	2/2/2/2	2/0/14/0	1kg	移植直後～バ' 12.5葉期	移植後30日まで	○2.5	○	○	○2	○2	○2	○始	○発	○前始	○前始	○前始	○始	○3cm	*前	ミ' アイ※					○
移植水稻							移植時		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
移植水稻	初中期	天空1キロ粒剤		1	1/3/2	15/27/2	1kg	移植直後～バ' 13葉期	移植後30日まで	○3	○	○	○3	○3	○3	○2	○発	○前始		*前始	*	*10cm		ミ' アイ※					○
移植水稻							移植時		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
移植水稻	初中期	トップガン250グラム		1	2/2/2/2	2/0/2/14	250g	移植直後～バ' 12.5葉期	移植後30日まで	○2.5	○	○	○2	○始	○2	○2	○発	○始	○始	○始		○3cm	○前	ミ' アイ1※			○	○	
移植水稻	初中期	トップガンGT1キロ粒剤75		1	2/2/2/2	2/0/2/14	1kg	移植直後～バ' 13葉期	移植後30日まで	○3	○	○	○2	○2	○2	○2	○発	○始	○始	○始		○3cm	○前						
移植水稻							移植時		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○		
移植水稻	初中期	トップガンジャンボ		1	2/2/2/2	2/0/2/14	小包装(ﾊﾞｯｸ)10個 (250g)	移植後3日～バ' 12.5葉期	移植後30日まで	○2.5	○	○	○2	○2	○2	○2	○発	○始					○前						
移植水稻	初中期	トップガンフロアブル		1	2/2/2/2	2/0/2/14	500mL	移植直後～バ' 13葉期	移植後30日まで	○3	○	○	○2	○2	○2	○始	○発	○始	○始	○前		○3cm	○前						
移植水稻							移植時		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○		
移植水稻	初中期	ドラゴンホークZジャンボ		1	2/2/2	2/0/14	小包装(ﾊﾞｯｸ)10個 (300g)	移植後3日～バ' 13葉期	移植後30日まで	○3	○	○	○3	○3	○4	○2	○発	*前始	○前始	○前始	*始	○3cm	*前	イ' /ササガ' サ※、ミ' アイ※					
移植水稻	初中期	ドラゴンホークZフロアブル		1	2/2/2	2/0/14	500mL	移植後3日～バ' 13葉期	移植後30日まで	○3	○	○	○3	○3	○4	○2	○発	*前始	○前始	○前始	*始	○3cm	*前	イ' /ササガ' サ※、ミ' アイ※		○		○	
移植水稻	初中期	バッチリLX1キロ粒剤		1	2/2/2/2	2/0/14/0	1kg	移植直後～バ' 12.5葉期	移植後30日まで	○2.5	○	○	○2	○2	○2	○始	○発	○前始	○前始	*始	*始	○3cm	*前	ミ' アイ※				○	
移植水稻							移植時		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○			
移植水稻	初中期	バッチリLXフロアブル		1	2/2/2/2	2/0/14/0	500mL	移植直後～バ' 12.5葉期	移植後30日まで	○2.5	○	○	○2	○2	○2	○始	○発	○前始	○前始	○前始	○始	○3cm		イ' /ササガ' サ※			○	○	
移植水稻							移植時		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
移植水稻	初中期	バッチリ1キロ粒剤		1	2/2/2	2/14/0	1kg	移植直後～バ' 12.5葉期	移植後30日まで	○2.5	○	○	○2	○2	○2	○2	○発	○前始	○始	○始	○始	○3cm	○前	SURササ' 42※、ミ' アイ2※				○	
移植水稻							移植時		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
移植水稻	初中期	バッチリジャンボ		1	2/2/2	2/14/0	小包装(ﾊﾞｯｸ)10個 (400g)	移植直後～バ' 12.5葉期	移植後30日まで	○2.5	○	○	○2	○始	○2	○始	○発	○前始	○始	○始	○始	○3cm	*前						
移植水稻	初中期	バッチリフロアブル		1	2/2/2	2/14/0	500mL	移植直後～バ' 12.5葉期	移植後30日まで	○2.5	○	○	○2	○2	○2	○始	○発	○前始	○始	○始	○始	○3cm	○前				○		
移植水稻							移植時		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○			
移植水稻	初中期	プライオリティ豆つぶ250		1	2/2	2/27	250g	移植直後～バ' 13.5葉期	移植後30日まで	○3.5	○	○	○3	○4	○15cm	○3	○発	○前始	*始	*始				イ' /ササガ' サ※、コナギ2			○	○	○
移植水稻	初中期	フルイニングジャンボ		1	1/2/2/3	15/14/2/27	小包装 (ﾊﾞｯｸ) 10個 (500g)	移植後7日～バ' 14葉期	収穫60日前まで	○4	○	○	○3	○4	○3	○3	○発	○前始	○矢尻前	○10cm	*始	○3cm	*前	雑草仔前※					
移植水稻	初中期	ブルーゼータフロアブル		1	2/3	2/27	500mL	移植後5日～バ' 13葉期	移植後30日まで	○3	○	○	○3	○3	○3	○3	○発	○前始	○始	○始	○始※	○3cm	○前	イ' /ササガ' サ※		○			
移植水稻	初中期	フルパワーMX1キロ粒剤		1	2/2/2	14/2/27	1kg	移植後5日～バ' 13.5葉期	収穫60日前まで	○3.5	○	○	○3	○3	○3	○2	○発	*前始	○前始	○始～10cm	○始～10cm	○3cm	*前	イ' /ササガ' サ※				○	
移植水稻	初中期	ベッカク1キロ粒剤		1	2/2/2	2/15/27	1kg	移植直後～バ' 13葉期	移植後30日まで	○3	○	○	○3	○3	○15cm	○3	○発	○前始	○前始	*前始	*前始	○3cm	*前	コナギ2					
移植水稻							移植時		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	*	*	○	*	

作物名	区分	薬剤名		本剤の使用回数	成分毎の使用回数	HRACコード	希釈倍数・10a当たり使用量/散布量	使用時期		適用雑草※1															その他 (その他の適用雑草・ 適用直播様式等)	処理方法				
										一年生雑草					多年生雑草											表層剥離	藻類・ シズイ			
								除草効果・薬害に基づく使用時期	作物残留試験に基づく使用期限	ノビエ	広葉その他	マツパイ	ホタルイ	ヘラオモダカ	ミズガヤツリ	ウリカワ	ヒルムシロ	セリ	オモダカ	クログワイ	コウキヤガラ	シズイ								
移植水稻	初中期	ベッカクジャンボ	ビ'リスル7アン2%,フェ'キサスルホ'ン6%,フェ'ンキ'トリオ'ン12%	1	2/15/27	27/2	小包装(ﾊﾞｯｸ)10個(250g)	移植後3日～ﾊﾞ'13葉期	移植後30日まで	○3	○	○	○3	○3	○15cm	○3	○発	○前始	○前始	*	*始	○3cm		コギ'1、雑草'後前、モ'ダカ・クロ'グワイ・コ'キガラ・シズ'イは後処理剤との体系で使用する						
移植水稻	初中期	ベッカク豆つぶ'250	ビ'リスル7アン2%,フェ'キサスルホ'ン6%,フェ'ンキ'トリオ'ン12%	1	2/15/27	27/2	250g	移植後3日～ﾊﾞ'13葉期	移植後30日まで	○3	○	○	○3	○3	○15cm	○3	○発	○前始	○前始	*	*始	○3cm		コギ'1、雑草'後前、モ'ダカ・クロ'グワイ・コ'キガラ・シズ'イは後処理剤との体系で使用する						
移植水稻	初中期	ペルーガ1キロ粒剤		1	2/2	2/27	1kg	移植直後～ﾊﾞ'13葉期	移植後30日まで	○3	○	○	○3	○3	○3	○2	○発	*前始	○前始		○始									
移植水稻								移植時		○	○	○	○	○	○	○	○	○			○									
移植水稻	初中期	ベンケイ1キロ粒剤		1	2/2/3	2/15/27	1kg	移植直後～ﾊﾞ'13葉期	移植後30日まで	○3	○	○	○2	○2	○2	○2	○発	○前始	*前始	*前始	*始	○3cm								○
移植水稻								移植時		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○									
移植水稻	初中期	ホクト粒剤		1	3/2/1/2	1/5/2/15	3kg	移植後5日～ﾊﾞ'13葉期	移植後30日まで	○3	○	○	○2	○2	○2	○2	○発	○始	○始	○始			○前							
移植水稻	初中期	ボデーガードプロ1キロ粒剤		1	2/2	27/2	1kg	移植直後～ﾊﾞ'13.5葉期	移植後30日まで	○3.5	○	○	○3	○3	○3	○2	○発	○前*始	○前～ﾊﾞ'3葉S	○前*始	*始～10cmS	*始～30cmS	○3cm		クサネム1、エ'ノ'サカ'グ'リ'※、コナギ3					○
移植水稻								移植時		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○									
移植水稻	初中期	ボデーガードプロジャンボ		1	2/2	27/2	小包装(ﾊﾞｯｸ)10個(300g)	移植後5日～ﾊﾞ'13葉期	移植後30日まで	○3	○	○	○3	○4	○4	○2	○発	*前始S	○前*始S	*始～25cmS	*始～25cmS									
移植水稻	初中期	ボデーガードフロアブル		1	2/2	27/2	500mL	移植後5日～ﾊﾞ'13.5葉期	移植後30日まで	○3.5	○	○	○3	○4	○4	○2	○発	○前始	○前～*ﾊﾞ'3葉S	○始～*10cmS	*始～*30cmS									○
移植水稻	初中期	マスラオジャンボ		1	2/2/2	2/2/27	小包装(ﾊﾞｯｸ)10個(200g)	移植直後～ﾊﾞ'13葉期	移植後30日まで	○3	○	○	○3	○3	○10cm	○3	○発	○前始	○前始	*前始	*	○3cm		コナギ1						
移植水稻	初中期	メガゼータ1キロ粒剤		2	2/2	14/2	1kg	移植直後～ﾊﾞ'13葉期	収穫60日前まで	○3	○	○	○3	○3	○3	○2	○発	○前始	○始	○始	○始	○3cm	*前	ミ'ア'イ'1※、エ'ノ'サカ'グ'リ'※						○
移植水稻								移植時		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○								
移植水稻	初中期	メガゼータジャンボ		2	2/2	14/2	小包装(ﾊﾞｯｸ)10個(400g)	移植後5日～ﾊﾞ'13葉期	収穫60日前まで	○3	○	○	○2	○2	○2	○2	○発	○前始	○始	○始	*始	○3cm	*前							
移植水稻	初中期	メガゼータフロアブル		1	2/2	14/2	500mL	移植後5日～ﾊﾞ'13葉期	移植後30日まで	○3	○	○	○3	○3	○3	○3	○発	○前始	○始	○始	○始	○3cm	○前	ミ'ア'イ'1※、エ'ノ'サカ'グ'リ'※			○			○
移植水稻	初中期	流星フロアブル	フェ'ンキ'トリオ'ン6.0%/ﾊﾞ'ント'サ'グ'ン5.0%/タ'グ'ス'70'ン2.0%	1	2/2/2		500mL	移植後3日～ﾊﾞ'13葉期	移植後30日まで	○3	○	○	○3	○2	○10cm	○2	○発	○再												○
移植水稻								移植同時※2		○	○	○	○	○	○	○	○	○												
移植水稻	初中期	レオゼータフロアブル	ﾌﾞ'ロ'ビ'リスル70'ン1.7%,フェ'ンキ'トリオ'ン5.6%,ﾌﾞ'ロ'ビ'チ'ド'16.7%	1	2/27/30		500mL	移植後3日～ﾊﾞ'14葉期	移植後30日まで	○4	○	○	○4	*3	○15cm	○2	○発	○前始	○失1S	○10cmS	*15cmS	○3cm		コギ'3、エ'ノ'サカ'グ'リ'2※、シズ'イは後処理剤との体系で使用する					○	
移植水稻	中期	アトカラSジャンボMX		1	1/2/2	2/2/27	小包装(ﾊﾞｯｸ)20個(500g)	移植後20日～ﾊﾞ'13.5葉期	収穫45日前まで	○3.5	○	○	○3	○3	○5	○2	○発	○再	*失3	○20cm	*20cm	*20cm		コギ'2						
移植水稻	中期	オシオキMX1キロ粒剤		1	1/2/2	2/2/27	1kg	移植後14日～ﾊﾞ'14葉期	収穫45日前まで	○4	○	○	○4	○3	○4	○3	○発	○前始	○失1	○30cm	○30cm	○30cm								○
移植水稻	中期	ゲバード1キロ粒剤		1	3/2/2/3	0/14/2/27	1kg	移植後14日～ﾊﾞ'14葉期	収穫60日前まで	○4	○	○	○4	○4	○5	○3	○発	○再	*始～失3		*生30cm	*生20cm								○
移植水稻	中期	ザーベックスDX1キロ粒剤		1	3/2/2/2	1/5/15/4	1kg	移植後20～30日(ﾊﾞ'13.5葉期まで)[移植前後の初期除草剤による土壌処理との体系で使用]		○3.5	○	○	○2	○始	○2				○始	○始		○3cm								
移植水稻	中期	サンバンチ1キロ粒剤		1	3/2/2/3	1/5/2/27	1kg	移植後15日～ﾊﾞ'13.5葉期	収穫60日前まで	○3.5	○	○	○4	○3	○4	○4	○発	○始	○失1	○30cm	○30cm	○30cm	○始	体'ク'20cm、ク'420cm						○
移植水稻	中期	セカンドショットSジャンボMX		1	1/2/2	2/2/27	小包装(ﾊﾞｯｸ)20個(500g)	移植後20日～ﾊﾞ'13.5葉期	収穫45日前まで	○3.5	○	○	○3	○3	○5	○2	○発	○再	*失3	○20cm	*20cm	*20cm		コギ'2						
移植水稻	中期	ツイゲキ1キロ粒剤		1	2/2/2	5/2/27	1kg	移植後20日(稲5葉期以降)～ﾊﾞ'14葉期	収穫60日前まで	○4	○	○	○15cm	○4	○20cm	○3	○盛	○再	○生失4	*30cm	*30cm			コギ'4						
移植水稻	中期	ハイカット1キロ粒剤		1	3/2/2/3	1/5/2/27	1kg	移植後15日～ﾊﾞ'13.5葉期	収穫60日前まで	○3.5	○	○	○4	○3	○4	○4	○発	○始	○失1	○30cm	○30cm	○30cm	○始	体'ク'20cm、ク'420cm						○
移植水稻	中・後期	アトトリ1キロ粒剤		1	2	2	1kg	移植後14日(稲5葉期以降)～ﾊﾞ'14葉期	収穫45日前まで	○4					○6	○4	○発	○再	○失1	○30cm	○30cm	○30cm								○
移植水稻	中・後期	ウィードコア1キロ粒剤	ﾌ'ロ'ビ'ラ'キ'フェ'ン'ベ'ン'ジ'0.4%/ﾊﾞ'ノ'キ'ス'タ'0.5%/ﾊﾞ'ン'ジ'シ'カ'ン2.0%	2	3/2/3		1kg	移植後15日～ﾊﾞ'14葉期	収穫60日前まで	○4	○		○3		○3	○2	○発	○再				○15cm		イボクサ20cm						
移植水稻	中・後期	クリンチャーバースME液剤		2	3/2	1/6	1000mL/70～100L	移植後15日～ﾊﾞ'15葉期	収穫50日前まで	○5	○	○	○盛中	○盛中	○盛中	○盛中		○初盛	○15cm	○20cm	○盛	○5cm								

作物名	区分	薬剤名		本剤の使用回数	成分毎の使用回数	HRACコード	希釈倍数・10a当たり使用量/散布流量	使用時期		適用雑草※1															その他 (その他の適用雑草・適用直播様式等)	処理方法										
										一年生雑草		多年生雑草											表層剥離													
								除草効果・薬害に基づく使用時期	作物残留試験に基づく使用晩限	ノビエ	広葉その他	マツパイ	ホタルイ	ヘラオモダカ	ミズガヤツリ	ウリカワ	ヒルムシロ	セリ	オモダカ	クログワイ	コウキヤガラ	シズイ														
移植水稻	中・後期	スケダチ1キロ粒剤		2	2	2	1kg	移植後7日～/レ' I4葉期	収穫45日前まで	○4	-		○4	○4		○3	○生			○10cm	○10cm	○10cm								○						
移植水稻			1.5kg				移植後14日～/レ' I5葉期	収穫45日前まで	○5			○	○		○	○			○	○	○												○			
移植水稻	中・後期	ソニックブームZ1キロ粒剤	ｼｸﾛﾋﾞ ｼﾓﾚｰﾄ1.5%/ｼﾏﾄﾘﾝ1.5%/ﾌﾞﾗｼﾞﾙﾄﾘｵﾝ3.0%/ﾌﾞﾛﾋﾞ ｼｽﾐｽ70/0.90%	1	2/2/2		1kg	移植後14日～/レ' I4葉期	収穫60日前まで	○4	○		○15cm		○25cm	○6	○盛	○再																		
移植水稻	中・後期	ニトウリュウ1キロ粒剤		1	2/3	2/27	1kg	移植後15日～/レ' I4葉期	収穫60日前まで	○4	○	○	○3	○4	○3	○2	○発	○前始	○30cm	○20cm	*20cm	○20cm									○					
移植水稻	中・後期	ニトウリュウジャンボ		1	2/3	2/27	小包装(ﾊﾞｯｸ)10個(500g)/10a	移植後15日～/レ' I4葉期	収穫60日前まで	○4	○	○	○3		○15cm	○3	○発	*再	*	*	*						ｺﾅﾃﾞ3									
移植水稻	中・後期	ノブレクト乳剤	700ﾋﾞﾌﾗｷｼﾌｴﾝﾊﾞﾝｼﾞ #2.1%/ｼﾊﾛﾙﾌﾞﾌﾞ #10.6%	2	3/3		250ml/100L	移植後20日～ノビエ5葉期	収穫45日前まで	○5	○	○			○	○		○																		
移植水稻	中・後期	バサグラン液剤(ナトリウム塩)		2	2	6	500～700mL/70～100L	移植後15日～収穫45日前まで	収穫45日前まで		○ (材料を除く)	○	○盛中	○盛中	○盛中			○盛初	○30cm	○増	○10cm～30cm															
移植水稻	中・後期	バサグラン粒剤(ナトリウム塩)		1	2	6	3～4kg	移植後15日～収穫45日前まで	収穫45日前まで		○ (材料を除く)	○	○盛中	○盛中	○盛中			○盛揃	○15cm		○10cm～30cm															
移植水稻	中・後期	ヒエクリンバサグラン粒剤		1	2/2	2/6	3kg	移植後15日～/レ' I4葉期	収穫60日前まで	○4	○	○	○3	○4	○3	○3			○矢抽	○15cm		○30cm														
移植水稻	中・後期	レプラス1キロ粒剤		1	2/3 2/2	5/0/27/2	1kg	移植後14日～/レ' I4葉期	収穫60日前まで	○4	○	○	○4	○4	○4	○3	○発	○再	*始～矢3		*30cm	○20cm										○				
移植水稻	中・後期	ロイヤント乳剤	700ﾋﾞﾌﾗｷｼﾌｴﾝﾊﾞﾝｼﾞ #2.7%	2	3		200mL/25～100L	移植後20～40日	収穫45日前まで	○5	○			○ﾊﾞ2	○10cm	○3	○発	○再				○30cm														
移植水稻	中・後期	ワイドアタックD1キロ粒剤		1	3/2	0/2	1kg	移植後15日～/レ' I5葉期(稲4葉期以降)	収穫60日前まで	○5	○	○	○茎始	○4	○5	○2	○発	*生	○盛～30cm	○15cm	*15cm	○10cm										○				
移植水稻	中・後期	ワイドアタックSC	ﾊﾞ/ｽｽｽﾙ3.6%	2	2	0/2	100mL/70～100L	移植後20～40日(稲5葉期以降)	収穫30日前まで	○5	○	○	○茎始	○4	○4	○4	○生	○生	○30cm	○20cm	*20cm	○20cm														
移植水稻							100mL/0.8～1.6L			○5																										
移植水稻	中・後期	ワイドショット1キロ粒剤		1	2/2	27/2	1kg	移植後15日～/レ' I4葉期	収穫45日前まで	○4	○	○	○4	○ﾊﾞ1	○3	○3	○発		○30cm	○20cm		○20cm										○				
移植水稻	中・後期	ワイドパワー粒剤		1	2/2	2/6	3kg	移植後20日～/レ' I5葉期	収穫45日前まで	○5	○	○	○5	○5	○5	○4	○生		○矢抽	○20cm		○20cm														
移植水稻	ノビエ	クリンチャー1キロ粒剤		2	3	1	1kg	移植後7日～/レ' I4葉期	収穫30日前まで	○4																						○				
移植水稻			1.5kg				移植後25日～/レ' I5葉期	収穫30日前まで	○5																										○	
移植水稻	ノビエ	クリンチャーEW		2	3	1	100mL/25～100L (無人航空機の場合、 100mL/0.8～1.6L)	移植後20日～/レ' I6葉期 (無人航空機の場合、移植後 20日～/レ' I4.5葉期)	収穫30日前まで	○6																						○				
移植水稻	ノビエ	クリンチャージャンボ		2	3	1	小包装(ﾊﾞｯｸ)20個(1kg)	移植後7日～/レ' I4葉期	収穫30日前まで	○4																										
移植水稻			小包装(ﾊﾞｯｸ)30個(1.5kg)				移植後25日～/レ' I5葉期	収穫30日前まで	○5																											
移植水稻	ノビエ	トドメMF1キロ粒剤		3	3	1	1kg	移植後14日～/レ' I5葉期	収穫50日前まで	○5																						○				
移植水稻	ノビエ	トドメMF乳剤		2	2	1	200mL/100L	移植後14日～/レ' I7葉期	収穫50日前まで	○7																										
移植水稻	ノビエ	ヒエクリン1キロ粒剤		1	2	2	1kg	移植後15日～/レ' I4葉期	収穫45日前まで	○4																						○				
移植水稻	ノビエ	ワンステージ1キロ粒剤		1	2	2	1kg	移植後15日～/レ' I4葉期	収穫45日前まで	○4																						○				
移植水稻	ｸｸｽ・ｲｸ' ｸ	ノミニー液剤		1	1	2	50～100mL/100L	移植後30日～ｸｸｽの草丈40cmまで	収穫60日前まで																											
移植水稻			移植後30日～ｲｸ' ｸの茎長30cmまで					収穫60日前まで																												
移植水稻	藻類他	モゲトンジャンボ		3	3	0	20個(1kg)	ｸ' ｸｸ類、ﾌ' ﾐﾄﾞ' ﾀ・藻類による表層はく離の発生時	収穫45日前まで																											
移植水稻	藻類他	モゲトン粒剤		3	3	0	2～3kg	ウキクサ類、藻類の発生始～発生盛期	収穫45日前まで																								○			
移植水稻			2kg				藻類・表層はく離の発生時	収穫45日前まで																											○	
移植水稻			1～2kg																																	○
移植水稻			3～4kg																																	

作物名	区分	薬剤名		本剤の使用回数	成分毎の使用回数	HRACコード	希釈倍数・10a当たり使用量/散布量	使用時期		適用雑草※1																その他 (その他の適用雑草・適用直播様式等)	処理方法								
										一年生雑草		多年生雑草															藻類・表層剥離								
								除草効果・薬害に基づく使用時期	作物残留試験に基づく使用期限	ノビエ	広葉その他	マツパイ	ホタルイ	ヘラオモダカ	ミズガヤツリ	ウリカワ	ヒルムシロ	セリ	オモダカ	クログワイ	コウキヤガラ	シズイ													
移植水稻																		○													○				
直播水稻	耕起前・出芽前	草枯らしMIC		1	2	9	250～500mL/100L	耕耘20～10日前(雑草生育期)																								一年生雑草			
直播水稻				2	2		250～1000mL/50L	耕起直後～出芽前(雑草生育期)(乾田耕起栽培)																									一年生雑草、乾田直播		
直播水稻							500mL/50L																											多年生雑草、乾田直播	
直播水稻							250～1000mL/50L	播種30日前～出芽前(雑草生育期)(乾田不耕起栽培)																										一年生雑草、乾田直播	
直播水稻							500mL/50L																											多年生雑草、乾田直播	
直播水稻	耕起前・出芽前	タッチダウンiq		1	2	9	250～500mL/25～100L	耕起前(雑草生育期;草丈30cm以下)																								一年生雑草			
直播水稻							250～500mL/50～100L	播種30日前～出芽前(雑草生育期)(乾田不耕起栽培)																								一年生雑草、乾田直播			
直播水稻	耕起前・出芽前	ブリグロックスL		1	1/2	22/22	600～1000mL/100～150L	秋期稲刈取後又は春期水田耕起1ヶ月前～直前まで又は雑草生育期、播種前14日～播種後7日(稲出芽前)																								一年生雑草			
直播水稻	耕起前・出芽前	ラウンドアップマックスロード		2	2	9	200～500mL/50～100L(通常散布)	耕起前(雑草生育期)																									一年生雑草、多年生雑草		
直播水稻							500mL/5～25L(少量散布)	耕起前(雑草生育期)																											一年生雑草、多年生雑草
直播水稻							200～500mL/25～50L(少量散布)	耕起直後～出芽前(雑草生育期)(乾田耕起栽培)																											一年生雑草、多年生雑草、乾田直播
直播水稻							播種30日前～出芽前(雑草生育期)(乾田不耕起栽培)																												
直播水稻	乾直入水前	サターンバアロ乳剤		1	1/2	5/15	600～800mL/70～100L	播種直後～稲出芽前(ノビエ15期前まで)(入水15日前まで)		○1	○	○																				乾田直播			
直播水稻	乾直入水前	シャドー水和剤		1	2	2	90～180g/50～100L(通常散布)、25～50L(少量散布)	乾田直播の入水10～2日前(稲2葉期以降、雑草草丈30cm以下)			○	○	○		○	○	○	○														一年生広葉雑草、乾田直播			
直播水稻	乾直入水前	ノミニエ液剤		1	1	2	100～200mL/100L	乾田直播の播種後10日～ノビエ15期前まで	収穫60日前まで	○5	○																					乾田直播			
直播水稻	乾直入水前	ハードバンチDF		2	2/2	14/2	30g/100L	乾田直播の稲2葉期～ノビエ15期前(入水前)	収穫60日前まで	○5	タデ類3、クサネム4、アメリカセンダングサ1													クサネム、アメリカセンダングサ、ノビエ、タデ類、乾田直播											
直播水稻	乾直入水前	マーシェット乳剤		1	2	15	1000～1500mL/50～100L(通常散布)、25～50L(少量散布)	乾田直播の播種直後～稲出芽前(雑草発生前)(入水15日前まで)		○前	○前	○前	○前																			乾田直播			
直播水稻							500mL/50～100L(通常散布)、25～50L(少量散布)	乾田直播の入水10日～2日前		○	○	○	○																						乾田直播
直播水稻	乾直入水前・湛水落水処理	スタム乳剤35		1	1	5	550～1100mL/50～100L	稲出芽始期～ノビエ3葉期	収穫90日前まで	○3	○																					落水もしくはごく浅水で散布し、散布日を含む3日間は入水しない。			
直播水稻	初期	カインMF1キロ粒剤	ベンゾビシクロ2.0%/タキアブ0.23%	1	3/3		1kg	湛水直播の播種直後～ノビエ2.5葉期	収穫60日前まで	○2.5	○	○	○3	○前	○5cm		○発															○			
直播水稻	初期	兆1キロ粒剤		1	2	14	1kg	湛水直播の稲出芽始期～ノビエ1.5葉期	収穫60日前まで	○1.5	○	○	○始			○始	○発															湛水直播、表面播種を除く			
直播水稻								湛水直播の播種直後～稲出芽前	収穫60日前まで	○	○	○	○			○	○																		湛水直播、表面播種を除く
直播水稻								播種時		○	○	○	○			○	○																		
直播水稻	初期	兆フロアブル		1	2	14	500mL/100L	湛水直播の稲出芽始期～ノビエ1.5葉期	収穫60日前まで	○1.5	○	○	○始			○始	○発															湛水直播、表面播種を除く			
直播水稻								湛水直播の播種直後～稲出芽前	収穫60日前まで	○	○	○	○			○	○																		
直播水稻	初期	サキドリEW		1	2/2	15/14	300mL	湛水直播の代かき時(播種7日前まで)		○	○	○	○		○																	湛水直播			
直播水稻								湛水直播の代かき後～播種前7日		○	○	○	○		○																				

作物名	区分	薬剤名		本剤の使用回数	成分毎の使用回数	HRACコード	希釈倍数・10a当たり使用量/散布流量	使用時期		適用雑草※1																その他 (その他の適用雑草・適用直播様式等)	処理方法				
										一年生雑草		多年生雑草															表層剥離				
								除草効果・薬害に基づく使用時期	作物残留試験に基づく使用晩限	ノビエ	広葉その他	マツパイ	ホタルイ	ヘラオモダカ	ミズガヤツリ	ウリカワ	ヒルムシロ	セリ	オモダカ	クログワイ	コウキヤガラ	シズイ									
直播水稻	初期	シンウチEW	1	2/2	15/14	300mL	湛水直播の代かき時(播種7日前まで)		○	○	○	○		○								湛水直播									
直播水稻							湛水直播の代かき後～播種前7日		○	○	○	○		○									湛水直播								
直播水稻	初期	ビラクロン1キロ粒剤	1	2	14	1kg	湛水直播の稲出芽始期～/ビ i1.5葉期	収穫60日前まで	○1.5	○	○	○始			○始	○発						湛水直播、表面播種を除く					○				
直播水稻							湛水直播の播種直後～稲出芽前	収穫60日前まで	○	○	○	○			○	○							湛水直播、表面播種を除く						○		
直播水稻							播種時		○	○	○	○			○	○								湛水直播、表面播種を除く		○					
直播水稻	初期	ビラクロンフロアブル	1	2	14	500mL/100L	湛水直播の稲出芽始期～/ビ i1.5葉期	収穫60日前まで	○1.5	○	○	○始			○始	○発						湛水直播、表面播種を除く									
直播水稻							湛水直播の播種直後～稲出芽前	収穫60日前まで	○	○	○	○			○	○							湛水直播、表面播種を除く								
直播水稻	初中期	アールタイプ1キロ粒剤	1	2/3/2	27/27/2	1kg	稲1葉期～/ビ i2.5葉期	収穫90日前まで	○2.5	○	○	○2		○2	○始	○発	○前始					コナギ2					○				
直播水稻	初中期	アールタイプジャンボ	1	2/3/2	27/27/2	小包装(ﾊﾞｯｸ)10個(400g)	稲1葉期～/ビ i2.5葉期	収穫90日前まで	○2.5	○	○	○2		○3	○2	○発	○再					コナギ2									
直播水稻	初中期	アールタイプフロアブル	1	2/3/2	27/27/2	500mL	稲1葉期～/ビ i2.5葉期	収穫90日前まで	○2.5	○	○	○3	○2	○2	○始	○発	○前始					コナギ1			○		○				
直播水稻	初中期	アカツキジャンボ	ﾌｪﾝｷﾞｽﾏﾙｷﾝ 8.0% ﾌｪﾝｷﾞﾄﾘﾅﾝ 12.0% ﾏﾞﾗﾌﾞ ﾏﾅﾌﾞﾛﾝ 4.0%	1	2/2/2		25g×10コ/250g	稲1葉期～/ビ i3葉期	収穫60日前まで	○3	○		○3		○15cm	○3	○発					表面播種を除く									
直播水稻	初中期	アカツキ豆つぶ250	ﾌｪﾝｷﾞｽﾏﾙｷﾝ 8.0% ﾌｪﾝｷﾞﾄﾘﾅﾝ 12.0% ﾏﾞﾗﾌﾞ ﾏﾅﾌﾞﾛﾝ 4.0%	1	2/2/2		250g	稲1葉期～/ビ i3葉期	収穫60日前まで	○3	○		○3		○15cm	○3	○発					表面播種を除く									
直播水稻	初中期	アクシズMX1キロ粒剤		1	2/2/2	2/27/2	1kg	稲1葉期～/ビ i4葉期	収穫45日前まで	○4	○	○	○3		○3		○発	○前始				表面播種は稲2葉期～					○				
直播水稻	初中期	アッパレZ1キロ粒剤		1	2/2/2	14/2/0	1kg	稲1葉期～/ビ i3葉期	収穫90日前まで	○3	○	○	○2		○3	○2	○発	○前始			○前	表面播種を除く、コナギ3					○				
直播水稻	初中期	アシュラ1キロ粒剤	ﾄﾘﾌｱﾌﾞﾓﾝ0.5%,ﾋﾞﾗｸﾛﾆ2%,ﾍﾞﾝｼﾞｼｸﾛ2%	1	4/14/27	2/27/2	1kg	稲1葉期～/ビ i4葉期	収穫90日前まで	○4	○	○	○4		○10cm	○3	○発	○前始	○始～/水3	○始～20cm		水ダカ・クログワイは体系処理で使用する									
直播水稻	初中期	アッパレZジャンボ		1	2/2/2	14/2/0	小包装(ﾊﾞｯｸ)10個(400g)	稲1葉期～/ビ i3葉期	収穫90日前まで	○3	○	○	○2		○3	○2	○発	○前始			○前	表面播種を除く、コナギ2									
直播水稻	初中期	アッパレZフロアブル		1	2/2/2	14/2/0	500mL	稲1葉期～/ビ i3葉期	収穫90日前まで	○3	○	○	○3		○3	○3	○発	○前始			○前	表面播種を除く、コナギ3									
直播水稻	初中期	イッテツ1キロ粒剤		1	2/1/3	2/15/27	1kg	稲1葉期～/ビ i2.5葉期	収穫90日前まで	○2.5	○	○	○2	○2	○2	○2	○発	○始													
直播水稻	初中期	イッテツジャンボ		1	2/1/3	2/15/27	小包装(ﾊﾞｯｸ)10個(400g)	稲1葉期～/ビ i2.5葉期	収穫90日前まで	○2.5	○	○	○2		○2	○始		○始													
直播水稻	初中期	イッテツフロアブル		1	2/1/3	2/15/27	500mL	稲1葉期～/ビ i2.5葉期	収穫90日前まで	○2.5	○	○	○2		○2	○2	○発	○始													
直播水稻	初中期	イッポン1キロ粒剤75		1	2/2/2	14/0/2	1kg	稲1葉期～/ビ i2.5葉期	収穫90日前まで	○2.5	○	○	○2			○2	○発	○始									○				
直播水稻	初中期	イッポンジャンボ		1	2/2/2	14/0/2	小包装(ﾊﾞｯｸ)10個(500g)	稲1葉期～/ビ i2.5葉期	収穫90日前まで	○2.5	○	○	○2	○2	○始	○始	○発	○前始				湛水直播、コナギ1									
直播水稻	初中期	イッポンフロアブル		1	2/2/2	14/0/2	500mL	稲1葉期～/ビ i2.5葉期	収穫90日前まで	○2.5	○	○	○2	○2		○2	○発	○始									○				
直播水稻	初中期	イネキング1キロ粒剤		1	2/2/3	14/27/27	1kg	稲1葉期～/ビ i2.5葉期	収穫90日前まで	○2.5	○	○	○2		○2	○2						表面播種を除く					○				
直播水稻	初中期	イネキングジャンボ		1	2/2/3	14/27/27	小包装(ﾊﾞｯｸ)10個(500g)	稲1葉期～/ビ i2.5葉期	収穫90日前まで	○2.5	○	○	○2		○2	○2	○発					表面播種を除く									
直播水稻	初中期	イネキングフロアブル		1	2/2/3	14/27/27	500mL	稲1葉期～/ビ i2.5葉期	収穫90日前まで	○2.5	○	○	○2		○2	○2	○発					表面播種を除く			○		○				
直播水稻	初中期	イネリーグジャンボ	ｸﾛﾏﾌﾞ ﾛｯﾌﾟ 11.2%,ﾌﾞﾗｼﾞﾙﾄﾘﾌﾞ 7.5%,ﾌｪﾝﾄﾞﾗﾞ ﾏﾞﾄﾞ 7.5%	1	2/2/1	4/27/15	小包装(ﾊﾞｯｸ)10個(400g)	稲1葉期～/ビ i3葉期	収穫90日前まで	○3	○		○3		○10cm	○3	○発	○前始				表面播種を除く、コナギ3		○	○						
直播水稻	初中期	ウィナー1キロ粒剤75		1	2/2/2	15/0/2	1kg	稲1葉期～/ビ i2.5葉期	収穫90日前まで	○2	○	○	○2	○前	○始		○発	○前始				湛水直播、表面播種を除く					○				

作物名	区分	薬剤名		本剤の使用回数	成分毎の使用回数	HRACコード	希釈倍数・10a当たり使用量/散布量	使用時期		適 用 雑 草 表1														その他 (その他の適用雑草・ 適用直播様式等)	処理方法					
										年生雑草		多年生雑草													表層剥離	藻類・				
								除草効果・薬害に基づく使用時期	作物残留試験に基づく使用晩期	ノビエ	広葉その他	マツパイ	ホタルイ	ヘラオモダカ	ミズガヤツリ	ウリカワ	ヒルムシロ	セリ	オモダカ	クログワイ	コウキヤガラ	シズイ	同時処理				田植・播種	水口施用	周縁散布	無人航空機
直播水稻	初中期	ウィナージャンボ		1	2/2/2	15/0/2	小包装(ﾊﾞｯｸ)10個(500g)	稲1葉期～ﾊﾞｲ 12.5葉期	収穫90日前まで	○2	○	○	○2		○10cm	○始	○発	○前始							表面播種を除く、ｺﾏｷ 1					
直播水稻	初中期	ウィナーフロアブル		1	2/2/2	15/0/2	500mL	稲1葉期～ﾊﾞｲ 12.5葉期	収穫90日前まで	○2	○	○	○2	○2	○始	○始	○発	○前始							表面播種を除く、ｺﾏｷ 始					○
直播水稻	初中期	ウルティモZフロアブル	ｼｬﾛﾋﾞ ｾﾚｰﾄ5.5%、ﾋﾞﾗﾞ ｾｰﾄ11%、ﾌﾞﾛﾋﾞ ｾｰﾄ1.65%	1	2/2/2	33/27/2	500mL	稲1葉期～ﾊﾞｲ 13.5葉期	収穫90日前まで	○3.5	○	○	○3	○2	○15cm	○3	○発								表面播種を除く、ﾏｽ ｱｲ2、ｺﾏｷ 2					○
直播水稻	初中期	エンペラーフロアブル	ﾋﾞﾗﾞ ｾｰﾄ3.7%、ﾋﾞﾗﾞ/ﾊﾞｯｸ 1.4%、ﾌｧﾝｷﾞﾄﾞﾘｵﾝ 5.6%	1	2/2/2	2/15	500mL	稲出芽揃～ﾊﾞｲ 13葉期	収穫90日前まで	○3	○	○	○3		○15cm	○2	○発								表面播種を除く					
直播水稻	初中期	カイリキZジャンボ		1	2/2/2		小包装(ﾊﾞｯｸ)10個(300g)	稲1葉期～ﾊﾞｲ 13葉期	収穫90日前まで	○3	○	○	○3		○15cm	○3	○発	○前始					○前		表面播種を除く、ｺﾏｷ 2					
直播水稻	初中期	カウンシルコンブリート1キロ粒剤		1	2/2	27/2	1kg	播種直後～ﾊﾞｲ 13.5葉期	収穫90日前まで	○3.5	○	○	○2		○3	○3	○発	○前始							ｺﾏｷ 1					○
直播水稻	初中期	カウンシルコンブリートジャンボ		1	2/2	27/2	小包装(ﾊﾞｯｸ)10個(300g)	稲1葉期～ﾊﾞｲ 13葉期	収穫90日前まで	○3	○	○	○3		○3	○2	○発	○前始												
直播水稻	初中期	カウンシルコンブリートフロアブル		1	2/2	27/2	500mL	播種直後～ﾊﾞｲ 13.5葉期	収穫90日前まで	○3.5	○	○	○3		○3	○3	○発								ｺﾏｷ 3			○		○
直播水稻	初中期	ガンガン1キロ粒剤		1	2/2	2/15	1kg	稲1葉期～ﾊﾞｲ 13葉期	収穫60日前まで	○3	○	○	○3	○3	○3	○3	○発	○始												○
直播水稻	初中期	ガンガンジャンボ		1	2/2	2/15	小包装(ﾊﾞｯｸ)10個(250g)	稲1葉期～ﾊﾞｲ 12.5葉期	収穫60日前まで	○2.5	○	○	○2	○2	○2	○2	○発	○前始							表面播種を除く					
直播水稻	初中期	キマリテジャンボ		1	2/2	15/27	小包装(ﾊﾞｯｸ) 10個(300g)	稲1葉期～ﾊﾞｲ 13葉期	収穫90日前まで	○2.5	○	○	○2		○3	○2	○発	○前始							表面播種を除く、ｺﾏｷ 2					
直播水稻	初中期	キマリテフロアブル		1	2/2	15/27	500mL	稲1葉期～ﾊﾞｲ 13葉期	収穫90日前まで	○3	○	○	○2	○2	○3	○2	○発	○前始							表面播種を除く、ｺﾏｷ 3					○
直播水稻	初中期	銀河1キロ粒剤		1	2/2/2	0/14/2	1kg	稲2葉期～ﾊﾞｲ 13葉期	収穫60日前まで	○3	○	○	○3		○3	○2	○発								表面播種を除く					○
直播水稻	初中期	クサトッタ1キロ粒剤		1	2/2/2/2	5/27/15/0	1kg	稲1.5葉期～ﾊﾞｲ 12葉期	収穫90日前まで	○2	○	○	○2		○2	○2	○発								イボクサ：再生始※					
直播水稻	初中期	クサバルカンジャンボ		1	2/2/3	14/27/27	小包装(ﾊﾞｯｸ)10個(500g)	稲1葉期～ﾊﾞｲ 12.5葉期	収穫90日前まで	○2.5	○	○	○2		○2	○2	○発								表面播種を除く					
直播水稻	初中期	クサバルカンフロアブル		1	2/2/3	14/27/27	500mL	稲1葉期～ﾊﾞｲ 12.5葉期	収穫90日前まで	○2.5	○	○	○2		○2	○2	○発	○前始							表面播種を除く			○		○
直播水稻	初中期	コメット1キロ粒剤		1	2/2/2	27/14/2	1kg	稲1葉期～ﾊﾞｲ 12.5葉期	収穫60日前まで	○2.5	○	○	○2		○5cm	○2	○発	○前始							表面播種を除く、ｺﾏｷ 2					○
直播水稻	初中期	コメット顆粒		1	2/2/2	27/14/2	80 g /500mL	稲1葉期～ﾊﾞｲ 12.5葉期	収穫90日前まで	○2.5	○	○	○3		○10cm	○2	○発								表面播種を除く、ｺﾏｷ 2					○
直播水稻			80 g				稲1葉期～ﾊﾞｲ 12.5葉期	収穫60日前まで	○	○	○	○		○	○	○						表面播種を除く 専用袋使用し顆粒のまま処理					○			
直播水稻	初中期	サキガケ素粒	ｲﾌﾞ ｴﾝﾊﾞﾙﾊﾞﾞﾝ 10.0%、ﾌﾞﾗｲﾄﾞﾄﾞﾘｵﾝ 12.0%、ﾌｧﾝｷﾞﾄﾞﾘｵﾝ 2.0%	1	2/2/2		250g	稲1.5葉期～ﾊﾞｲ 12.5葉期	収穫90日前まで	○2.5	○	○	○2		○5cm	○2	○発	○再							表面播種を除く					
直播水稻	初中期	サラブレードGO400FG	ｲﾔｼﾞ ｽﾙﾌｵﾝ 2.25%、ｷﾔｼﾞ ｸﾛﾛﾌｧﾝ 1.5%、ﾋﾞﾗﾞ ｾｰﾄ2.5%、ﾌﾞﾛﾋﾞ ｾｰﾄ22.5%	1	2/2/2/2		400g	稲1葉期～ﾊﾞｲ 12.5葉期	収穫90日前まで	○2.5	○	○	○2		○10cm	○2	○発	○前始					○前		表面播種を除く					
直播水稻	初中期	忍1キロ粒剤		1	2/2/3	2/14/27	1kg	稲1葉期～ﾊﾞｲ 12.5葉期	収穫90日前まで	○2.5	○	○	○2	○2	○2	○2	○発	○前始							表面播種を除く					○
直播水稻	初中期	忍ジャンボ		1	2/2/3	2/14/27	小包装(ﾊﾞｯｸ)10個(200g)	稲1葉期～ﾊﾞｲ 12.5葉期	収穫90日前まで	○2.5	○	○	○2	○2	○2	○2	○発	○前始							ｺﾏｷ 2					
直播水稻	初中期	忍フロアブル		1	2/2/3	2/14/27	500mL	稲1葉期～ﾊﾞｲ 12.5葉期	収穫90日前まで	○2.5	○	○	○2	○2	○2	○始	○発	○前始		○始					表面播種は稲1葉期～、ｺﾏｷ 2			○		○
直播水稻	初中期	ジェイフレンドフロアブル		1	2/2/2	0/27/14	500mL	稲1葉期～ﾊﾞｲ 12.5葉期	収穫90日前まで	○2.5	○	○	○2		○3	○2	○発	○前始							表面播種を除く、ｺﾏｷ 2					
直播水稻	初中期	ジャスタフロアブル	ｼｬﾛﾋﾞ ｾﾚｰﾄ5.5%、ﾄﾞﾘﾌﾞｱﾈﾝ0.9%、ﾋﾞﾗﾞ ｾｰﾄ11.0%	1	2/2/2		500mL	稲1葉期～ﾊﾞｲ 13.5葉期	収穫90日前まで	○3.5	○	○	○3	○2	○10cm	○3	○発						○前		表面播種を除く			○		
直播水稻	初中期	シュナイデン1キロ粒剤		1	2/3/2	27/27/2	1kg	稲1葉期～ﾊﾞｲ 12.5葉期	収穫90日前まで	○2.5	○	○	○2		○2	○始	○発	○前始							ｺﾏｷ 2					○

作物名	区分	薬剤名		本剤の使用回数	成分毎の使用回数	HRACコード	希釈倍数・10a当たり使用量/散布量	使用時期		適用雑草※1															その他 (その他の適用雑草・ 適用直播様式等)	処理方法						
										一年生雑草		多年生雑草												表層剥離		田植・播種	水口施用	周縁散布	無人航空機			
								除草効果・薬害に基づく使用時期	作物残留試験に基づく使用晩限	ノビエ	広葉その他	マツパイ	ホタルイ	ヘラオモダカ	ミズガヤツリ	ウリカワ	ヒルムシロ	セリ	オモダカ	クログワイ	コウキヤガラ	シズイ										
直播水稲	初中期	シュナイデンジャンボ		1	2/3/2	27/27/2	小包装(ﾊﾟｯｸ)10個(400g)	稲1葉期～ﾊﾞｲ 12.5葉期	収穫90日前まで	○2.5	○	○	○2		○3	○2	○発	○再							ｺﾏﾞﾞ 2							
直播水稲	初中期	シュナイデンフロアブル		1	2/3/2	27/27/2	500mL	稲1葉期～ﾊﾞｲ 12.5葉期	収穫90日前まで	○2.5	○	○	○3	○2	○2	○始	○発	○前始							ｺﾏﾞﾞ 1			○		○		
直播水稲	初中期	ストレングス 1 キロ粒剤	ﾌﾞﾗｼﾞﾙﾄﾘﾎﾝ3.0%/ﾄﾘｱﾌﾌｴﾝ0.50%/ﾌﾙﾋﾞﾌﾗｳｷｼﾞｮﾝ40.45%	2	2/2/3		1kg	稲1葉期～ﾊﾞｲ 14葉期	収穫90日前まで	○4	○	○	○4		○20cm	○5	○発	○再														
直播水稲	初中期	スラッシュ 1 キロ粒剤		1	2/2/2/2	5/27/15/0	1kg	稲1.5葉期～ﾊﾞｲ 12葉期	収穫90日前まで	○2	○	○	○2		○2	○2	○発							イボクサ：再生始※								
直播水稲	初中期	ゼータタイガージャンボ		1	2/2/2	2/0/14	小包装(ﾊﾟｯｸ)10個(300g)	稲1葉期～ﾊﾞｲ 13葉期	収穫90日前まで	○3	○	○	○3		○3	○2	○発	○前始					○前	表面播種を除く、ｺﾏﾞﾞ 2								
直播水稲	初中期	ゼータタイガーフロアブル		1	2/2/2	2/0/14	500mL	稲1葉期～ﾊﾞｲ 13葉期	収穫90日前まで	○3	○	○	○3		○3	○2	○発	○前始					○前	表面播種を除く、ｺﾏﾞﾞ 2							○	
直播水稲	初中期	ゼータファイヤフロアブル		1	2/2	2/0	500mL	稲1葉期～ﾊﾞｲ 13葉期	収穫90日前まで	○3	○	○	○3	○2	○10cm	○3	○発	○前始					○前	表面播種を除く、ｺﾏﾞﾞ 1								
直播水稲	初中期	ゼータプラス200FG	ﾌｧﾝｷﾄﾘﾎﾝ15.0%/ﾌﾞﾛﾋﾞﾘｽ470ｼﾞ4.5%	1	2/2		200g	稲1葉期～ﾊﾞｲ 14葉期	収穫75日前まで	○4	○	○	○4		○20cm	○5	○発	○前始						表面播種を除く								
直播水稲	初中期	センイチMX 1 キロ粒剤		1	2/2/2	14/2/27	1kg	稲1葉期～ﾊﾞｲ 13.5葉期	収穫60日前まで	○3.5	○	○	○3		○3	○3	○発	○前始													○	
直播水稲	初中期	ダブルスター S B 顆粒		1	1/1/3	2/15/27	80g/500mL、 80g（顆粒水口施用）	稲1葉期～ﾊﾞｲ 12.5葉期	収穫90日前まで	○2.5	○	○	○2		○2	○2												○ 顆粒のまま				
直播水稲	初中期	タンボパワー 1 キロ粒剤		1	2/2/2	14/2/27	1kg	稲1葉期～ﾊﾞｲ 13.5葉期	収穫60日前まで	○3.5	○	○	○3		○3	○3	○発	○前始													○	
直播水稲	初中期	ツルギ 2 5 0 粒剤		1	2/2/3	15/2/27	250g	稲1葉期～ﾊﾞｲ 12.5葉期	収穫90日前まで	○2.5	○	○	○3		○10cm	○2	○発	○再						ｺﾏﾞﾞ 2							○	
直播水稲	初中期	ディオーレジャンボ	ｷﾅｼﾞ ｸﾛﾓﾝ1%/ﾌﾞﾗｼﾞﾙﾄﾘﾎﾝ5%/ﾒﾀﾞｽ 470ｼﾞ2.5%	1	2/2/2		40g × 10 コ	稲1葉期～ﾊﾞｲ 13葉期	収穫90日前まで	○3	○	○	○3		○10cm	○3	○発	○前始						表面播種を除く								
直播水稲	初中期	デルタアタック 1 キロ粒剤		1	2/2/2/2	2/0/14/0	1kg	稲1葉期～ﾊﾞｲ 12.5葉期	収穫90日前まで	○2.5	○	○	○2		○2	○始	○発	○再					○前	ｺﾏﾞﾞ 2							○	
直播水稲	初中期	天空 1 キロ粒剤		1	1/3/2	15/27/2	1kg	稲1葉期～ﾊﾞｲ 13葉期	収穫90日前まで	○3	○		○3		○10cm	○2	○発	○再						表面播種を除く、ｺﾏﾞﾞ 2							○	
直播水稲	初中期	トップガン 2 5 0 グラム		1	2/2/2/2	2/0/2/14	250g	稲1葉期～ﾊﾞｲ 12.5葉期	収穫90日前まで	○2.5	○	○	○2		○2	○2	○発	○始											○	○		
直播水稲	初中期	トップガンGT 1 キロ粒剤 7 5		1	2/2/2/2	2/0/2/14	1kg	稲1葉期～ﾊﾞｲ 13葉期	収穫90日前まで	○3	○	○	○2	○2	○2	○2	○発	○始														
直播水稲	初中期	トップガンフロアブル		1	2/2/2/2	2/0/2/14	500mL	稲1.5葉期～ﾊﾞｲ 13葉期	収穫90日前まで	○3	○	○	○2		○2																	
直播水稲	初中期	ドラゴンホーク Z ジャンボ		1	2/2/2	2/0/14	小包装(ﾊﾟｯｸ)10個(300g)	稲1葉期～ﾊﾞｲ 13葉期	収穫90日前まで	○3	○	○	○3		○3	○2	○発	○前始					○前	表面播種を除く、ｺﾏﾞﾞ 2								
直播水稲	初中期	ドラゴンホーク Z フロアブル		1	2/2/2	2/0/14	500mL	稲1葉期～ﾊﾞｲ 13葉期	収穫90日前まで	○3	○	○	○3		○3	○2	○発	○前始					○前	表面播種を除く、ｺﾏﾞﾞ 2							○	
直播水稲	初中期	バッチリ L X 1 キロ粒剤		1	2/2/2/2	2/0/14/0	1kg	稲1葉期～ﾊﾞｲ 12.5葉期	収穫90日前まで	○2.5	○	○	○2		○2	○始	○発	○再					○前	ｺﾏﾞﾞ 2							○	
直播水稲	初中期	バッチリ L X フロアブル		1	2/2/2/2	2/0/14/0	500mL	稲1葉期～ﾊﾞｲ 12.5葉期	収穫90日前まで	○2.5	○	○	○2	○2	○2	○2	○発	○再					○前	ｺﾏﾞﾞ 2							○	
直播水稲	初中期	バッチリ 1 キロ粒剤		1	2/2/2	2/14/0	1kg	稲出芽始期～ﾊﾞｲ 12.5葉期	収穫90日前まで	○2.5	○	○	○2		○2	○1	○発	○前始													○	
直播水稲	初中期	バッチリジャンボ		1	2/2/2	2/14/0	小包装(ﾊﾟｯｸ)10個(400g)	稲1葉期～ﾊﾞｲ 12.5葉期	収穫90日前まで	○2.5	○	○	○2		○2	○始	○発	○前始														
直播水稲	初中期	バッチリフロアブル		1	2/2/2	2/14/0	500mL	稲出芽始期～ﾊﾞｲ 12.5葉期	収穫90日前まで	○2.5	○	○	○2		○2	○2	○発	○前始						表面播種は稲1葉期～			○					

作物名	区分	薬剤名		本剤の使用回数	成分毎の使用回数	HRACコード	希釈倍数・10a当たり使用量/散布流量	使用時期		適用雑草※1															その他 (その他の適用雑草・ 適用直播様式等)	処理方法						
										一年生雑草		多年生雑草												表層剥離・藻類								
								除草効果・薬害に基づく使用時期	作物残留試験に基づく使用晩期	ノビエ	広葉その他	マツバイ	ホタルイ	ヘラオモダカ	ミズガヤツリ	ウリカワ	ヒルムシロ	セリ	オモダカ	クログワイ	コウキヤガラ	シズイ										
直播水稻	初中期	ブライオリティ豆つぶ250		1	2/2	2/27	250g	稲出芽揃期～/ビ 13.5葉期	収穫90日前まで	○3.5	○	○	○3		○15cm	○4	○盛	○前始						表面播種を除く、コギ 2						○		
直播水稻	初中期	フルイニングジャンボ		1	1/2/2/3	15/14/2/27	小包装(バック)10個(500g)	稲1葉期～/ビ 14葉期	収穫60日前まで	○4	○	○	○3			○3	○発	○再						表面播種を除く、コギ 3								
直播水稻	初中期	ブルーゼータフロアブル		1	2/3	2/27	500mL	稲1.5葉期～/ビ 13葉期	収穫75日前まで	○3	○	○	○3	○2	○2	○2	○発					○前	表面播種を除く、コギ 3									
直播水稻	初中期	フルパワーMX 1キロ粒剤		1	2/2/2	14/2/27	1kg	稲1葉期～/ビ 13.5葉期	収穫60日前まで	○3.5	○	○	○3		○3	○2	○発	○前始												○		
直播水稻	初中期	ベッカク1キロ粒剤		1	2/2/2	2/15/27	1kg	稲1葉期～/ビ 13葉期	収穫75日前まで	○3	○	○	○3		○15cm	○2	○発	○前始						表面播種を除く、コギ 2								
直播水稻	初中期	ベッカクジャンボ	ビリスルファン2%,フェキサスルファン6%,フェンキトリオン12%	1	2/2/2	2/15/27	小包装(バック)10個(250g)	稲1葉期～/ビ 13葉期	収穫75日前まで	○3	○	○	○3		○15cm	○2	○発	○再						表面播種を除く、ミズアヒ1、コギ 2								
直播水稻	初中期	ベッカク豆つぶ250	ビリスルファン2%,フェキサスルファン6%,フェンキトリオン12%	1	2/2/2	2/15/27	250g	稲1葉期～/ビ 13葉期	収穫75日前まで	○3	○	○	○3		○15cm	○2	○発	○再						表面播種を除く、ミズアヒ1、コギ 2								
直播水稻	初中期						1kg	播種直後～/ビ 13葉期	収穫75日前まで	○3	○	○	○3	○2	○2	○始	○発	○前始						コギ 3								
直播水稻							0.5～1kg	播種時		○	○	○	○	○	○	○	○	○								○						
直播水稻									播種直後		○	○	○	○	○	○	○	○							ごく浅く湛水して散布							
直播水稻	初中期	ベンケイ1キロ粒剤		1	2/2/3	2/15/27	1kg	稲1葉期～/ビ 13葉期	収穫90日前まで	○3	○	○	○3		○3	○2	○発	○前始						表面播種を除く							○	
直播水稻	初中期	ボデーガードプロ1キロ粒剤		1	2/2	27/2	1kg	播種直後～/ビ 13.5葉期	収穫90日前まで	○3.5	○	○	○2		○3	○3	○発	○前始						コギ 1							○	
直播水稻								播種時		○	○	○	○		○	○	○	○							○							
直播水稻	初中期	ボデーガードプロジャンボ		1	2/2	27/2	小包装(バック)10個(300g)	稲1葉期～/ビ 13葉期	収穫90日前まで	○3	○	○	○3		○3	○2	○発	○前始														
直播水稻	初中期	ボデーガードプロフロアブル		1	2/2	27/2	500mL	播種直後～/ビ 13.5葉期	収穫90日前まで	○3.5	○	○	○3		○3	○3	○発							コギ 3			○				○	
直播水稻	初中期	マスラオジャンボ		1	2/2/2	2/2/27	小包装(バック)10個(200g)	稲1葉期～/ビ 13葉期	収穫90日前まで	○3	○	○	○3		○5cm	○2	○発					○前	コギ 2									
直播水稻	初中期	メガゼータ1キロ粒剤		2	2/2	14/2	1kg	稲1葉期～/ビ 13葉期	収穫60日前まで	○3	○	○	○3		○3	○3	○発	○前始					○前								○	
直播水稻	初中期	メガゼータジャンボ		2	2/2	14/2	小包装(バック)10個(400g)	稲1葉期～/ビ 13葉期	収穫60日前まで	○3	○		○3		○3	○3	○発	○前始					○前	表面播種を除く、コギ 3								
直播水稻	初中期	メガゼータフロアブル		1	2/2	14/2	500mL	稲1葉期～/ビ 13葉期	収穫60日前まで	○3	○	○	○3		○4	○3	○発	○前始						表面播種を除く、コギ 3							○	
直播水稻	初中期	流星フロアブル	フェンキトリオン6.0%/ベンチギン5.0%/タダメ2.0%	1	2/2/2		500mL	稲1葉期～/ビ 13葉期	収穫90日前まで	○3	○	○	○3		○10cm	○2	○発	○前始						表面播種を除く								
直播水稻	初中期	レオゼータフロアブル	ブロードリスルファン1.7%,フェンキトリオン5.6%,ブロードチン16.7%	1	2/2/2	2/27/30	500mL	稲1葉期～/ビ 14葉期	収穫90日前まで	○4	○	○	○4		○15cm	○4	○盛	○前始					○前	表面播種を除く、コギ 4								
直播水稻	中期	アトカラSジャンボMX		1	1/2/2	2/2/27	小包装(バック)20個(500g)	稲4葉期～/ビ 14葉期	収穫45日前まで	○4	○	○	○4		○15cm	○3	○盛	○再						コギ 3								
直播水稻	中期	オシオキMX 1キロ粒剤		1	1/2/2	2/2/27	1kg	稲3葉期～/ビ 13.5葉期	収穫45日前まで	○3.5	○	○	○4		○4	○4	○生	○始													○	
直播水稻	中期	ゲバード1キロ粒剤		1	2/2/3/2	0/14/2/27	1kg	稲2葉期～/ビ 14葉期	収穫60日前まで	○4	○	○	○4		○15cm	○4	○盛	○再						コギ 4							○	
直播水稻	中期	ザーベックスDX 1キロ粒剤		1	3/2/2/2	1/5/15/4	1kg	稲5葉期～/ビ 13.5葉期まで [播種後の初期除草剤による土壌処理との体系で使用]	収穫60日前まで	○3.5	○	○	○3		○2	○3	○発						○始									
直播水稻	中期	サンバンチ1キロ粒剤		1	3/2/2/3	1/5/2/27	1kg	稲3葉期～/ビ 13.5葉期まで	収穫60日前まで	○3.5	○	○	○4		○4	○4	○発														○	
直播水稻	中期	セカンドショットSジャンボMX		1	1/2/2	2/2/27	小包装(バック)20個(500g)	稲4葉期～/ビ 14葉期	収穫45日前まで	○4	○	○	○4		○15cm	○3	○盛	○再						コギ 3								
直播水稻	中期	ツイゲキ1キロ粒剤		1	2/2/2	5/2/27	1kg	稲5葉期～/ビ 14葉期	収穫60日前まで	○4	○	○	○4		○20cm	○4	○発	○再	○生矢4	○生30cm				表面播種を除く、コギ 3								
直播水稻	中期	ハイカット1キロ粒剤		1	3/2/2/3	1/5/2/27	1kg	稲3葉期～/ビ 13.5葉期まで	収穫60日前まで	○3.5	○	○	○4		○4	○4	○発														○	
直播水稻	中・後期	アトトリ1キロ粒剤		1	2	2	1kg	稲5葉期～収穫45日前まで											○矢既3	○30cm												

作物名	区分	薬剤名		本剤の使用回数	成分毎の使用回数	HRACコード	希釈倍数・10a当たり使用量/散布量	使用時期		適用雑草※1																その他 (その他の適用雑草・ 適用直播様式等)	処理方法										
										一年生雑草		多年生雑草															藻類・ 表層剥離										
								除草効果・薬害に基づく使用時期	作物残留試験に基づく使用期限	ノビエ	広葉その他	マツパイ	ホタルイ	ヘラオモダカ	ミズガヤツリ	ウリカワ	ヒルムシロ	セリ	オモダカ	クログワイ	コウキヤガラ	シズイ															
直播水稻	中・後期	ウィードコア1キロ粒剤	700g/L 90%ベンゾジメチル 0.4%ベンゾスルホン 0.5%ベンゾピリジン 2.0%	2	3/2/3		1kg	稲3葉期～/ビ 14葉期	収穫60日前まで	○4	○	○	○4	○始	○15cm	○4		○再							前処理剤との組み合わせで使用する。 表面播種を除く												
直播水稻	中・後期	クリンチャーバスマE液剤		2	3/2	1/6	1000mL/70～100L	播種後10日～/ビ 15葉期	収穫50日前まで	○5	○	○	○盛中	○盛中	○盛中	○盛中																					
直播水稻	中・後期	スケダチ1キロ粒剤		2	2	2	1kg	稲1葉期～/ビ 14葉期	収穫45日前まで	○4			○4			○3									表面播種を除く												
1.5kg							稲3葉期～/ビ 15葉期	収穫45日前まで	○5			○4			○3													表面播種を除く									
直播水稻	中・後期	ニトウリュウ1キロ粒剤		1	2/3	2/27	1kg	稲4葉期～/ビ 14葉期	収穫60日前まで	○4	○	○	○4		○4	○4	○発								表面播種を除く、コキ 4							○					
直播水稻	中・後期	ニトウリュウジャンボ		1	2/3	2/27	小包装(パック)10個(500g)	稲4葉期～/ビ 14葉期	収穫60日前まで	○4	○	○	○4		○20cm	○3	○発						○前	コキ 3													
直播水稻	中・後期	ノブレット乳剤	700g/L 90%ベンゾジメチル 2.1%/90%アブメチル 10.6%	2	3/3		250ml/100L	稲3葉期～/ビ 15葉期	収穫45日前まで	○5	○				○	○		○							日植調技術指標原案掲載無し												
直播水稻	中・後期	バサグラン液剤(ナトリウム塩)		2	2	6	500～700mL/70～100L	播種後35日～収穫45日前まで	収穫45日前まで		○ (イネを除く)	○	○盛中	○盛中	○盛中	○盛中			○盛初	○15cm～30cm					水田一年生雑草(イネを除く)												
直播水稻	中・後期	バサグラン粒剤(ナトリウム塩)		1	2	6	3kg	稲3葉期～収穫45日前まで	収穫45日前まで		○ (イネを除く)	○	○盛中	○盛中	○盛中	○盛中									水田一年生雑草(イネを除く)												
直播水稻	中・後期	ヒエクリーンバサグラン粒剤		1	2/2	2/6	3kg	稲3葉期～/ビ 14葉期	収穫45日前まで	○4	○	○	○4																								
直播水稻	中・後期	レプラス1キロ粒剤		1	2/2/2/2	5/0/27/2	1kg	稲2葉期～/ビ 14葉期	収穫60日前まで	○4	○	○	○4		○15cm	○4	○盛	○増							表面播種を除く、コキ 4							○					
直播水稻	中・後期	ロイヤント乳剤	700g/L 90%ベンゾジメチル 2.7%	3	3		200ml/100L	稲3葉期～/ビ 15葉期	収穫45日前まで	○5	○		○5	○3	○20cm	○4		○増							前処理剤との組み合わせで使用する。 落水もしくはごく浅水で散布し、散布日を含む3日間は入水しない。												
直播水稻	中・後期	ワイドアタックD1キロ粒剤		1	2/2	0/2	1kg	稲3葉期～/ビ 15葉期	収穫60日前まで	○5	○	○	○4		○3	○3	○発	○前始														○					
直播水稻	中・後期	ワイドアタックSC	ベンゾスルホン 3.6%	2	2	0/2	100mL/100L	稲3葉期～/ビ 15葉期	収穫30日前まで	○5	○	○	○4	○4	○4	○4	○生	○生							ミズアオイ、コキ												
直播水稻							100mL/0.8～1.6L		○5																				日植調技術指標原案掲載無し							○	
直播水稻	中・後期	ワイドショット1キロ粒剤		1	2/2	27/2	1kg	稲4葉期～/ビ 14葉期	収穫45日前まで	○4	○	○	○4		○4	○3	○発	○前始							表面播種を除く、コキ 3							○					
直播水稻	中・後期	ワイドパワー粒剤		1	2/2	2/6	3kg	稲4葉期～/ビ 14葉期	収穫45日前まで	○4	○	○	○4		○3	○2	○発	○前始																			
直播水稻	ノビエ	クリンチャー1キロ粒剤		2	3	1	1kg	播種後10日～/ビ 13葉期	収穫30日前まで	○3																						○					
直播水稻	ノビエ	クリンチャーEW		2	3	1	100mL/25～100L (無人航空機の場合、 100mL/0.8～1.6L)	播種後10日～/ビ 15葉期(無人航空機の場合、 は播種後10日～/ビ 14.5葉期)	収穫30日前まで	○5														一年生イネ科								○					
直播水稻							小包装(パック)20個(1kg) 小包装(パック)30個(1.5kg)	播種後10日～/ビ 13葉期	収穫30日前まで	○3																											
直播水稻	ノビエ	トドメMF1キロ粒剤		3	3	1	1kg	稲3.5葉期～/ビ 14葉期まで	収穫50日前まで	○4																						○					
直播水稻	ノビエ	トドメMF乳剤		2	2	1	200mL/100L	播種後10日～/ビ 16葉期まで	収穫50日前まで	○6																											
直播水稻	ノビエ	ヒエクリーン1キロ粒剤		1	2	2	1kg	稲3葉期～/ビ 14葉期	収穫45日前まで	○4																							○				
直播水稻							0.5～1kg	播種時		○																											
直播水稻								播種直後		○																											
直播水稻							1kg	播種直後～稲出芽前		○																											
直播水稻	ノビエ	ワンステージ1キロ粒剤		1	2	2	1kg	稲3葉期～/ビ 14葉期	収穫45日前まで	○4																							○				
直播水稻								播種時		○																											
直播水稻							0.5～1kg	播種直後		○																											
直播水稻							1kg	播種直後～稲出芽前		○																											
直播水稻	クサネム・	ノミニー液剤		1	1	2	50～100mL/100L	稲4葉期以降(入水後)～クサネムの草丈40cmまで	収穫60日前まで															クサネム40cm													

作物名	区分	薬 剤 名		本剤の使用回数	成分毎の使用回数	HRACコード	希釈倍数・10a当たり使用量/散布流量	使用時期		適 用 雑 草 ※1																その他 (その他の適用雑草・ 適用直播様式 等)	処理方法			
										一年生雑草		多年生雑草												表層剥離						
								除草効果・薬害に基づく使用時期	作物残留試験に基づく使用晩限	ノビエ	広葉その他	マツパイ	ホタルイ	ヘラオモダカ	ミズガヤツリ	ウリカワ	ヒルムシロ	セリ	オモダカ	クログワイ	コウキヤガラ	シズイ								
直播水稻	休 耕							稲4葉期以降(入水後)～イネの茎長30cmまで	収穫60日前まで																イボクサ30cm					
直播水稻	藻類他	モゲトン粒剤		3	3	0	1.5～2kg	稲1葉期以降、アミドn、表層はく離発生時	収穫45日前まで														○発						○	
水稻	後期	MCPソーダ塩		1	1	4	160～240g/70～100L	有効分けつ終止期～幼穂形成期前	収穫60日前まで		○	○		○		○	○								水田一年生雑草(イネ科を除く)					
水田作物	水田畦畔	草枯らしMIC		2	3	9	250～500mL/ {100L (通常散布) 又は 25L(少量散布)}	雑草生育期 (草丈30cm以下)	収穫14日前まで																	一年生雑草30cm				
							500～1000mL/ {100L (通常散布) 又は 25L(少量散布)}	雑草生育期 (草丈30cm以下)	収穫14日前まで																	多年生雑草30cm				
水田作物	水田畦畔	グラスショート 液剤		3	3	2	300～500mL/ {50～100L (通常散布) 又は 25L(少量散布)}	雑草生育初期(草丈10cm)及び草刈り後10～20日の雑草再生期	収穫前日まで																	一年生雑草10cm、多年生雑草10cm				
							300～500mL/50～100L	生育期	収穫前日まで																	休 耕				
水田作物	水田畦畔	ザクサ液剤		2	2	10	500～1000mL/100～150L	雑草生育期;草丈30cm以下	収穫7日前まで																	一年生雑草、多年生雑草				
水田作物	水田畦畔	タッチダウン i Q		2	3	9	250～500mL/50～100L	雑草生育期 (草丈30cm以下)	収穫14日前まで																	一年生雑草30cm				
							500～1000mL/50～100L	雑草生育期 (草丈30cm以下)	収穫14日前まで																	多年生雑草30cm				
							1500～2000mL/50～100L	雑草生育期 (草丈30cm以下)	収穫14日前まで																	休 耕 30cm				
水田作物	水田畦畔	バスタ液剤		2	2	10	500～1000mL/100～150L	雑草生育期(草丈30cm以下)	収穫7日前まで																	一年生雑草30cm、多年生雑草30cm				
水田作物	水田畦畔	ブリグロックSL		5	5/5	22/22	600～1000mL/100～150L	雑草生育期																		一年生雑草				
							1000～2000mL/100～150L	雑草生育期																		多年生雑草				
水田作物	水田畦畔	ラウンドアップマックスロード		3	3	9	200～1000mL/5～25L(少量散布)	雑草生育期	収穫前日まで																	一年生雑草、多年生雑草				
							200～500mL/ {50～100L (通常散布) 又は 25～50L(少量散布)}	雑草生育期	収穫前日まで																	一年生雑草				
							200～1000mL/ {50～100L (通常散布) 又は 25～50L(少量散布)}	雑草生育期	収穫前日まで																	多年生雑草				
							1500～2000mL/ {50～100L (通常散布) 又は 25～50L(少量散布)}	雑草生育期	収穫前日まで																	休 耕				

作物名	区分	薬 剤 名		本剤の使用回数	成分毎の使用回数	HRACコード	希釈倍数・10a当たり使用量/散布量	使用時期		適 用 雑 草 ※1														その他 (その他の適用雑草・適用直播様式等)	処理方法			
								除草効果・被害に基づく使用時期	作物残留試験に基づく使用晩限	一年生雑草		多年生雑草										表層剥離						
										ノビエ	広葉その他	マツバイ	ホタルイ	ヘラオモダカ	ミズガヤツリ	ウリカワ	ヒルムシロ	セリ	オモダカ	クログワイ	コウキヤガラ		シズイ					
水田作物	水田刈跡	草枯らしM I C		1	1	9	250～500mL/25～100L	雑草生育期		一年生雑草														一年生雑草				
							500～1000mL/25～100L	雑草生育期		多年生雑草														多年生雑草				
水田作物	水田刈跡	タッチダウン i Q		1	1	9	250～500mL/25～100L	水田作物刈取後（雑草生育期）		一年生雑草														一年生雑草				
							500～1000mL/25～100L	水田作物刈取後（雑草生育期）		多年生雑草														多年生雑草				
							500～1000mL/25～100L	水田作物刈取後雑草再生時（草丈30cm以下）												○30cm	○30cm		水田雑草、雑草					
水田作物	水田刈跡	バスタ液剤		1	1	10	300～500mL/100～150L	雑草生育期		一年生雑草														一年生雑草				
水田作物	水田刈跡	ラウンドアップマックスロード		1	1	9	200～500mL/（50～100L（通常散布）又は500～1000mL/（50～100L（通常散布）又は	雑草生育期		一年生雑草														一年生雑草				
							500～1000mL/（50～100L（通常散布）又は	雑草生育期		多年生雑草														多年生雑草				
水田作物、畑作物	休耕田	草枯らしM I C		2	3	9	250～500mL/（50～100L（通常散布）又は	雑草生育期(草丈50cm以下)		一年生雑草														一年生雑草				
							250～500mL/50～100L	雑草生育期(草丈50cm以下)		一年生雑草50cm														一年生雑草50cm				
水田作物、畑作物	休耕田	タッチダウン i Q		2	3	9	500～1000mL/50～100L	雑草生育期(草丈50cm以下)		多年生雑草50cm														多年生雑草50cm				
							800～1000mL/100～150L	雑草生育期		一年生雑草														一年生雑草				
水田作物、畑作物	休耕田	バスタ液剤		3	3	10	500～1000mL/100～150L	雑草生育期(草丈50cm以下)		一年生雑草50cm、多年生雑草50cm														一年生雑草50cm、多年生雑草50cm				
水田作物、畑作物	休耕田	ラウンドアップマックスロード		3	3	9	200～500mL/（50～100L（通常散布）又は	雑草生育期		一年生雑草														一年生雑草				
							500～1000mL/（50～100L（通常散布）又は	雑草生育期		多年生雑草														多年生雑草				
							1500～2000mL/（50～100L（通常散布）又は	雑草生育期		※1														※1				
被災農地（休耕田）		東日本大震災により津波被害を受けた農地専用ラウンドアップマックスロード		2	2	9	2倍/0.8L	雑草生育期		一年生雑草、多年生雑草														一年生雑草、多年生雑草				専用

注）各有効成分の特徴については「ロ 有効成分の特徴」を参照のこと。左頁中の「*」の付記は、公益財団法人日本植物調節剤研究協会（<https://japrr.or.jp>）が取りまとめた「地域技術指標原案」の東北地域技術指標に基づく散布適期を示すもの。農業登録上の適用使用時期を越えるものではない。右頁の適用草種毎の「○」は本技術指標における適用草種であることを示し、数字は葉令もしくは草丈(cm)、漢字一文字等は雑草種の各生育時期、「S」は問題雑草を一発処理で防除可能なことを示す。

〔前：発生前、始：発生始期（セリの場合は再生始期）、発：発生期、増：増殖期、揃：発生揃期、初：増殖初期、中：増殖中期、盛：発生盛期・増殖盛期、生：生育期、再：再生期、塊：塊茎形成期、茎始：花茎抽出始（*ホハイ*）、矢：矢尻葉（*サダハ*）、線：線形葉（*サダハ*）〕、「※」は農業登録内容ではないが県内独自試験や他県もしくは他地域において実用性が確認されている内容、「*」は他地域の試験により農業登録はあるが東北地域での実用性が確認されていない内容を示す。