

## 4 牧草・飼料作物

【注意】乳剤及び水和剤等で「150～300ℓ」等と記載した 10a 当り散布液量（または希釈水量）は、作物の生育段階や散布作業等を考慮した目安である。農薬使用に当たっては、必ず農薬容器のラベルを確認し、使用方法に散布液量（または希釈水量）の記載がある場合は、その量を遵守すること。

### 1) 使用方法

| 区分                       | 除草剤名<br>(農薬名)                                   | HRAC<br>コード | 備 考                                                                                          |
|--------------------------|-------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 牧野・草地                    | アージラン液剤<br>(アシュラム液剤)                            | 18          | ○本剤及びアシュラムを含む農薬の総使用回数は1回以内。<br>○散布後14日間は放牧・採草を行わない。<br>○局所処理部周辺の牧草は飼料にしない。<br>○高温時の全面散布は避ける。 |
|                          | バンペルーD液剤<br>(MD B A液剤)                          | 4           | ○本剤及びMD B Aを含む農薬の総使用回数は1回以内。<br>○散布後翌春まで採草・放牧を行わない。<br>○まめ科牧草は薬害を生じる可能性が高い。                  |
|                          | ハーモニーDF<br>(チフェンスルフロンメチル水和剤)                    | 2           | ○本剤及びチフェンスルフロンメチルを含む農薬の総使用回数は1回以内。<br>○散布後21日間は放牧・採草を行わない。<br>○クローバ類は薬害を生じる可能性が高い            |
|                          | ラウンドアップマックスロード<br>(グリホサートカリウム塩液剤)               | 9           | ○本剤の使用回数は2回以内。グリホサートを含む農薬の総使用回数は3回以内。                                                        |
|                          | サンダーボルト 007<br>(グリホサートイソプロピルアミン塩・ピラフルフェンエチル水和剤) | 9/14        | ○本剤の使用回数は1回以内。グリホサートを含む農薬の総使用回数は3回以内。ピラフルフェンエチルを含む農薬の総使用回数は2回以内。                             |
| 牧野・草地<br>更新・造成時          | アージラン液剤<br>(アシュラム液剤)                            | 18          | ○本剤及びアシュラムを含む農薬の総使用回数は1回以内。<br>○散布後は14日間放牧・採草を行わない。                                          |
|                          | ラウンドアップマックスロード<br>(グリホサートカリウム塩液剤)               | 9           | 本剤及びグリホサートを含む農薬の総使用回数は3回以内。                                                                  |
| 牧野・草地<br>更新時             | タッチダウン i Q<br>(グリホサートカリウム塩液剤)                   | 9           | ○本剤の使用回数は2回以内。グリホサートを含む農薬の総使用回数は3回以内。                                                        |
| 飼料用<br>とうもろこし<br>(一年生雑草) | エコトップP乳剤<br>(ジメテナミドP・リニュロン乳剤)                   | 15/5        | ○本剤及びジメテナミドP、リニュロンを含む農薬の総使用回数は1回以内。<br>○適用土壌は、砂土を除く全土壌。                                      |
|                          | ゴーゴーサン乳剤<br>ゴーゴーサン乳剤30<br>(ペンディメタリン乳剤)          | 3           | ○本剤及びペンディメタリンを含む農薬の総使用回数は1回以内。<br>○キク科雑草、ツユクサに効果が劣る。                                         |
|                          | ゴーゴーサン細粒剤F<br>(ペンディメタリン粉粒剤)                     | 3           | ○本剤及びペンディメタリンを含む農薬の総使用回数は1回以内。<br>○適用土壌は、砂壤土～埴土。<br>○キク科雑草、ツユクサに効果が劣る。                       |
|                          | ロロックス<br>(リニュロン水和剤)                             | 5           | ○本剤及びリニュロンを含む農薬の総使用回数は1回以内。                                                                  |
|                          | クリアターン乳剤<br>(ベンチオカーブ・ペンディメタリン・リニュロン乳剤)          | 15/3/5      | ○本剤及びベンチオカーブ、ペンディメタリン、リニュロンを含む農薬の総使用回数は1回以内。<br>○適用土壌は、砂土を除く全土壌。                             |
|                          | クリアターン細粒剤F<br>(ベンチオカーブ・ペンディメタリン・リニュロン粉粒剤)       | 15/3/5      | ○本剤及びベンチオカーブ、ペンディメタリン、リニュロンを含む農薬の総使用回数は1回以内。<br>○適用土壌は、砂土を除く全土壌。                             |
|                          | カイトック細粒剤F<br>(ペンディメタリン・リニュロン粉粒剤)                | 3/5         | ○本剤及びペンディメタリン、リニュロンを含む農薬の総使用回数は1回以内。<br>○適用土壌は、砂壤土～埴土。                                       |
|                          | カイトック乳剤<br>(ペンディメタリン・リニュロン乳剤)                   | 3/5         | ○本剤及びペンディメタリン、リニュロンを含む農薬の総使用回数は1回以内。<br>○適用土壌は、砂壤土～埴土。                                       |
|                          | ラクサー乳剤<br>(アラクロール・リニュロン乳剤)                      | 15/5        | ○本剤及びアラクロール、リニュロンを含む農薬の総使用回数は1回以内。                                                           |

|                               |                                     |      |                                                                                                             |
|-------------------------------|-------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 飼料用<br>とうもろこし<br>(一年生雑草)      | ラッソー乳剤<br>(アラクロール乳剤)                | 15   | ○本剤及びアラクールを含む農薬の使用回数は1回以内。                                                                                  |
|                               | ゲザノンゴールド<br>(アトラジン・S-メトラクロール水和剤)    | 5/15 | ○本剤及びアトラジン、S-メトラクロールを含む農薬総使用は1回以内。                                                                          |
|                               | ゲザプリムフロアブル<br>(アトラジン水和剤)            | 5    | ○本剤及びアトラジンを含む農薬の総使用回数は1回以内。<br>○適用土壌は、砂土を除く全土壌。<br>○多年生雑草と深根性雑草には効果が劣る。                                     |
|                               | タッチダウン i Q<br>(グリホサートカリウム塩液剤)       | 9    | ○本剤及びグリホサートを含む農薬の総使用回数は2回以内。                                                                                |
|                               | バスタ液剤<br>(グルホシネート液剤)                | 10   | ○本剤及びグルホシネートを含む農薬の総使用回数は3回以内。                                                                               |
|                               | デュアールゴールド<br>(S-メトラクロール乳剤)          | 15   | ○本剤及びS-メトラクロールを含む農薬の総使用回数は1回以内。                                                                             |
|                               | ボクサー<br>(プロスルホカルブ乳剤)                | 15   | ○本剤及びプロスルホカルブを含む農薬の総使用回数は1回以内。                                                                              |
|                               | モーティブ乳剤<br>(ジメテナミドP・ペンディメタリン乳剤)     | 15/3 | ○本剤及びジメテナミドP、ペンディメタリンを含む農薬の総使用回数は1回以内。<br>○適用土壌は、砂土を除く全土壌。                                                  |
|                               | コダール S 水和剤<br>(プロメトリン・S-メトラクロール水和剤) | 5/15 | ○本剤及びプロメトリン、S-メトラクロールを含む農薬の総使用回数は1回以内。<br>○適用土壌は、砂土を除く全土壌。                                                  |
|                               | アルファード液剤<br>(トブラメゾン液剤)              | 27   | ○本剤及びトブラメゾンを含む農薬の総使用回数は1回以内。                                                                                |
|                               | ブルーシアフロアブル<br>(トルピラレート水和剤)          | 27   | ○本剤及びトルピラレートを含む農薬の総使用回数は1回以内。                                                                               |
|                               | トップメリットフロアブル<br>(ピロキサスルホン・リニュロン水和剤) | 15/5 | ○本剤及びピロキサスルホン、リニュロンを含む農薬の総使用回数は1回以内。                                                                        |
|                               | プロシード顆粒水和剤<br>(プロキサスルホン水和剤)         | 15   | ○本剤及びピロキサスルホンを含む農薬の総使用回数は1回以内。                                                                              |
|                               | フィールドスターP乳剤<br>(ジメテナミドP乳剤)          | 15   | ○本剤及びジメテナミドPを含む農薬総使用回数は1回以内。<br>○砂土では使用しない。<br>○アカザ科、アブラナ科、タデ科雑草に効果が劣る。                                     |
| 飼料用<br>とうもろこし<br>(一年生及び多年生雑草) | バサグラン液剤(ナトリウム塩)<br>(ベンタゾン液剤)        | 6    | ○本剤及びベンタゾンを含む農薬の総使用回数は1回以内。<br>○高温時や降雨直前の散布は避ける。                                                            |
|                               | カリスト<br>(メソトリオン水和剤)                 | 27   | ○本剤及びメソトリオンを含む農薬の総使用回数は1回以内。<br>○適用土壌は砂壤土～埴土。                                                               |
|                               | ラウンドアップマックスロード<br>(グリホサートカリウム塩液剤)   | 9    | ○本剤及びグリホサートを含む農薬の総使用回数は2回以内。                                                                                |
|                               | ワンホープ乳剤<br>(ニコスルフロン乳剤)              | 2    | ○本剤及びニコスルフロンを含む農薬の総使用回数は1回。<br>○有機リン系殺虫剤との7日以内の近接散布を避ける。<br>○特異的に葉害を生じる品種があるので注意する。<br>○シバムギ、レッドトップにも効果がある。 |
|                               | シャドー水和剤<br>(ハロスルフロンメチル水和剤)          | 2    | ○本剤及びハロスルフロンメチルを含む農薬の総使用回数は1回以内。<br>○有機リン系殺虫剤との7日以内の近接散布を避ける。                                               |
| 飼料用とうもろこし<br>(ギシギシ)           | ハーモニーDF 水和剤<br>(チフェンスルフロンメチル水和剤)    | 2    | ○本剤及びチフェンスルフロンメチルを含む農薬の総使用回数は1回以内。                                                                          |
| 飼料用とうもろこし(イチビ)                | ベルベカット乳剤<br>(フルチアセットメチル乳剤)          | 14   | ○本剤及びフルチアセットメチルを含む農薬の総使用回数は1回以内。                                                                            |

|                 |                                         |      |                                                                                                                              |
|-----------------|-----------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ソルガム<br>(一年生雑草) | ゴーゴーサン乳剤<br>ゴーゴーサン乳剤 30<br>(ペンディメタリン乳剤) | 3    | ○本剤及びペンディメタリンを含む農薬の総使用回数は 1 回以内。<br>○適用土壌は、砂壤土～埴土。<br>○散播条件では使用しない。<br>○播種時期の覆土は 3cm 以上にすること。<br>○雑草 2～3 葉期以降の処理は効果が急激に低下する。 |
|                 | ゴーゴーサン細粒剤 F<br>(ペンディメタリン粉粒剤)            | 3    | ○本剤及びペンディメタリンを含む農薬の総使用回数は 1 回以内。<br>○キク科雑草、ツユクサに効果が劣る。○適用土壌は、砂壤土～埴土。                                                         |
|                 | ロロックス<br>(リニュロン水和剤)                     | 5    | ○本剤及びリニュロンを含む農薬の総使用回数は 1 回以内。                                                                                                |
|                 | ラッソー乳剤<br>(アラクロール乳剤)                    | 15   | ○本剤及びアラクロールを含む農薬の総使用回数は 1 回。<br>○散播条件では使用しない。<br>○播種時期の覆土は 3cm 以上にすること。                                                      |
|                 | ラウンドアップマックスロード<br>(グリホサートカリウム塩液剤)       | 9    | ○本剤及びグリホサートを含む農薬の総使用回数は 2 回以内。                                                                                               |
|                 | タッチダウン i Q<br>(グリホサートカリウム塩液剤)           | 9    | ○本剤及びグリホサートを含む農薬の総使用回数は 2 回以内。                                                                                               |
|                 | ゲザノンゴールド (アトラジン・S-メトラクロール水和剤)           | 5/15 | ○本剤及びアトラジン、S-メトラクロールを含む農薬の総使用回数は 1 回以内。                                                                                      |
|                 | バサグラン液剤 (ナトリウム塩)<br>(ペンタゾン液剤)           | 6    | ○本剤及びペンタゾンを含む農薬の総使用回数は 1 回以内。                                                                                                |
|                 | ゲザブリムフロアブル<br>(アトラジン水和剤)                | 5    | ○本剤及びアトラジンを含む農薬の総使用回数は 1 回以内。<br>○適用土壌は、砂土を除く全土壌。                                                                            |

【注意】農薬使用に当たっては必ず農薬容器のラベルを確認し、有効成分ごとの総使用回数を遵守すること。