

## りんごが開花期を迎えています！ タイミングを逃さず、防除を実施しましょう！

- ・りんごの黒星病や褐斑病において、開花期前後は特に重要な防除時期です。
- ・りんご「ふじ」では開花期を迎えており、平年より生育が早まっています。
- ・落花期までに確実に防除を行いましょ。

### 1 生育状況

(1) 作況調査ほにおける「ふじ」の開花期は4月12日で平年より17日早い(表1)。

表1 りんごの生育状況(4月13日現在)

品種	発芽期		展葉期		開花期		満開期		落花期	
	本年	平年	本年	平年	本年	平年	本年	平年	本年	平年
「ふじ」	3/20	3/31	3/27	4/12	4/12	4/29	-	5/4	-	5/11

作況調査ほ：名取市高館(農業・園芸総合研究所)

### 2 防除のポイント

- ・本年はりんごの生育が平年より早く推移しているため、生育ステージに注意し、タイミングを逃さず、確実に防除を実施する。
- ・重要な防除時期である開花期直前及び落花期に、DMI剤もしくはその混合剤を散布する。ただし、耐性菌出現防止のため、年間2回以内の使用とする。
- ・開花期前後の散布間隔は10日以内とする。
- ・散布ムラが生じないよう、十分量を散布する。
- ・スピードスプレーヤーの防除では低速による全列走行とし、薬液のかかりにくい部分は病害虫の発生源になりやすいことから補完散布する。
- ・薬剤散布予定日に降雨が予想される場合は、散布を前倒しして降雨前に防除する。また、降雨が続く場合は、散布間隔があかないよう晴れ間をぬって防除を実施する。
- ・前年の黒星病等による被害葉は今年度の一次伝染源となるため適切に処理する。

《お問い合わせ先》

宮城県病害虫防除所

〒981-0914 仙台市青葉区堤通雨宮町4-17

TEL:022-275-8982 FAX:022-276-0429

E-mail:[byogai@pref.miyagi.lg.jp](mailto:byogai@pref.miyagi.lg.jp)



宮城県病害虫防除所  
トップページ



メルマガ登録フォーム