

令和7年度生育モニタリングの生育状況(宮城県古川農業試験場)

(令和7年9月3日現在)

1 生育状況

1) 移植栽培

品種名	耕種概要							生育状況(7月29日現在)						参考	
	播種日 (月/日)	苗の種類	移植日 (月/日)	栽植密度 (本/㎡)	基肥 (kgN/10a)	追肥 (kgN/10a)		出穂期			穂揃期葉色			成熟期	
								本年値	前年差	平年差	本年値	前年差	平年差	前年値 (月/日)	平年値 (月/日)
だて正夢	4月15日	稚苗	5月9日	18.5	5.0	1.0(7月15日)		7月29日	-4日	-7日	35.7	-0.7	+0.4	9月10日	9月18日
金のいぶき	4月15日	稚苗	5月9日	18.5	5.0	1.0(7月3日)	1.0(7月25日)	7月28日	-7日	-10日	26.7	-8.0	-6.0	9月17日	9月26日

2) 直播栽培

品種名	耕種概要							生育状況(乾直8月8日現在)				参考	
	種類	播種方式	播種日	播種量 乾燥籾 (kg/10a)	基肥 (kgN/10a)	追肥 (kgN/10a)		出穂期		穂揃期葉色		成熟期	
								本年値	前年差	本年値	前年差	前年値 (月/日)	平年値 (月/日)
ひとめぼれ	乾田直播栽培	グレーンドリル機	4月12日	5.1(-1.9)	11.0	-		8月8日	+4日	36.1	+0.2	9月13日	

※1「乾田直播栽培」は平年値がないため前年値との比較

2 栽培管理等

1) 共通

- ・水管理は、収量・品質向上のため、間断かん水または飽水管理とし、落水は出穂後30日以降とする。
- ・收穫用機械、乾燥調製施設等の点検・整備を早めに行う。
- ・適期刈取りと適正な乾燥調製で良質米生産を目指す。

2) だて正夢・金のいぶき

- ・基本的な管理は、「ひとめぼれ」に準じて実施する。
- ・「金のいぶき」では刈遅れと刈数過剰により、穂発芽が増加する傾向が見られたので、刈取時期は出穂後の積算平均気温1,050～1,150℃(出穂後45日頃)を目安に行う。

今年度は今回で最終となります