令和6年播種（令和7年産）麦類作況試験生育状況（古川農試）〔4月10日調査結果〕

1 気象概況〔3月下旬～4月上旬〕(図1)

- 平均気温は、3月第5半旬、4月第2半旬で平年より高く、4月第1半旬は平年よりも低く推移した。
- 日照時間は、4月第1、2半旬は平年よりやや少なく推移した。
- 降水量は、3月第5、第6半旬、4月第2半旬で平年より少なく推移した。

図1 気象経過（古川アメダス）

2 生育概況

1) 4月10日現在の生育状況（表1）

10月中旬播種区

- 草丈は、大麦が平年より短く（平年比シュンライ 79%、ミノリムギ 76%、以下記載順同じ）、小麦は平年並～平年より短かった（平年比シラネコムギ 98%、夏黄金 86%、以下記載順同じ）。
- 茎数は、大麦が平年より多く（平年比 121%、110%）、小麦が平年並～平年よりやや少なかった（平年比 105%、94%）。
- 葉数は、大麦が平年並～やや多く（平年差+0.7枚、+0.2枚）、小麦が平年並～やや少なかった（平年差-0.3枚、-0.5枚）であった。
- 葉色（GM値）は、大麦は「ミノリムギ」が42.1、「シュンライ」が42.7、小麦は「シラネコムギ」が35.5、「夏黄金」が39.0であった。

10月下旬播種区

- 草丈は、大麦が平年より短く（平年比 70%、81%）、小麦が平年並～やや短かった（平年比 92%、103%）。
- 茎数は、大麦が平年より多く（平年比 122%、136%）、小麦も平年より多かった（平年比 122%、138%）。
- 葉数は、大麦が平年よりやや多く（平年差+0.8枚、+0.7枚）、小麦が平年並～やや多く（平年差+0.5枚、+0.4枚）であった。
- 葉色（GM値）は、大麦は「シュンライ」が46.5、「ミノリムギ」が46.6、小麦は「シラネコムギ」が42.3、「夏黄金」が46.5であった。

2) 4月9日現在の幼穂長と生育ステージの予測（表2、3）

10月中旬播種区

- 大麦の幼穂長は、平年より短く（平年差シュンライ-1.1mm、ミノリムギ-3.3mm）、出穂期は「シュンライ」が4月21日、「ミノリムギ」が4月26日、開花期は「シュンライ」が4月28日、「ミノリムギ」が5月3日と予測される。
- 小麦の幼穂長は、平年並～短く（平年差シラネコムギ-0.5mm、夏黄金-1.1mm）、出穂期は「シラネコムギ」が5月5日、「夏黄金」が5月3日、開花期は「シラネコムギ」が5月15日、「夏黄金」が5月14日と予測される。

10月下旬播種区

- ・大麦の幼穂長は、平年並～短く（平年差シュンライ-1.8 mm、ミノリムギ-0.5 mm）、出穂期は「シュンライ」が4月29日、「ミノリムギ」が5月2日、開花期は、「シュンライ」が5月5日、「ミノリムギ」が5月7日と予測される。
- ・小麦の幼穂長は平年並（平年差シラネコムギ+0.4 mm、夏黄金+0.4 mm）で、出穂期は「シラネコムギ」が5月6日、「夏黄金」が5月4日、開花期は「シラネコムギ」が5月17日、「夏黄金」が5月15日と予測される。

表1 生育状況（4月10日現在）

品種	区別	草丈(cm)			茎数(本/m ²)			葉数(枚)			葉色(GM値)			
		本年	前年比(%)	平年比(%)	本年	前年比(%)	平年比(%)	本年	前年差	平年差	本年	前年差	平年差	
		大	シュンライ	中甸播種区	24.6	74	79	847	147	121	10.7	-1.1	+0.7	42.7
		下甸播種区	17.8	59	70	782	125	122	9.6	-1.2	+0.8	46.5	-	-
	ミノリムギ	中甸播種区	23.7	68	76	862	141	110	10.5	-1.1	+0.2	42.1	-	-
		下甸播種区	20.3	62	81	951	125	136	9.6	-0.8	+0.7	46.6	-	-
小	シラネコムギ	中甸播種区	28.9	90	98	728	134	105	9.2	-1.5	-0.3	35.5	-	-
		下甸播種区	22.6	71	92	973	121	122	8.9	-0.7	+0.5	42.3	-	-
麦	夏黄金	中甸播種区	24.0	76	86	694	118	94	9.1	-1.4	-0.5	39.0	-	-
		下甸播種区	23.0	82	103	1016	109	138	8.5	-0.9	+0.4	46.5	-	-

注1) 平年値は、過去7か年中の最高値と最低値を除いた5か年分の平均値。
 注2) 葉色は令和6年播種から測定を開始したため前年差、平年差はない。
 注3) 中甸播種区は令和6年10月18日播種、下甸播種区は令和6年10月31日播種

表2 幼穂長調査（4月9日現在）

品種	区別	幼穂長(mm)			
		本年	前年差	平年差	
大	シュンライ	中甸播種区	18.8	-32.8	-1.1
		下甸播種区	8.4	-25.0	-1.8
	ミノリムギ	中甸播種区	13.0	-16.6	-3.3
		下甸播種区	7.5	-18.1	-0.5
小	シラネコムギ	中甸播種区	5.3	-4.6	-0.5
		下甸播種区	4.6	-3.2	+0.4
	夏黄金	中甸播種区	6.3	-5.9	-1.1
		下甸播種区	5.0	-3.7	+0.4

注1) 平年値は、過去7か年中の最高値と最低値を除いた5か年分の平均値。
 注2) 中甸播種区は令和6年10月18日播種、下甸播種区は令和6年10月31日播種

表3 減数分裂期、出穂期、開花期の本年予測値

品種名	区分	減数分裂期			出穂期			開花期			
		予測値(月日)	前年値(月日)	平年値(月日)	予測値(月日)	前年値(月日)	平年値(月日)	予測値(月日)	前年値(月日)	平年値(月日)	
大	シュンライ	中甸播種区	4/12	4/4	4/12	4/21	4/15	4/23	4/28	4/22	4/30
		下甸播種区	4/22	4/8	4/18	4/29	4/20	4/28	5/5	4/22	5/4
	ミノリムギ	中甸播種区	4/17	4/10	4/17	4/26	4/19	4/28	5/3	4/25	5/4
		下甸播種区	4/23	4/12	4/21	5/2	4/21	5/2	5/7	4/26	5/6
小	シラネコムギ	中甸播種区	4/25	4/18	4/24	5/5	4/26	5/3	5/15	5/5	5/13
		下甸播種区	4/26	4/21	4/26	5/6	4/28	5/7	5/17	5/6	5/16
	夏黄金	中甸播種区	4/24	4/17	4/24	5/3	4/26	5/3	5/14	5/5	5/13
		下甸播種区	4/26	4/20	4/26	5/4	4/28	5/6	5/15	5/6	5/15

注1) 平年値は、過去7か年中の最高値と最低値を除いた5か年分の平均値。
 注2) 減数分裂期: 幼穂長が3cmに達した日。
 注3) 出穂期: 全茎の40～50%が出穂した日。
 注4) 開花期: 全穂数の40～50%が開花した日。
 注5) 予測値は予測シート ver4.0 を用いた値。
 注6) 中甸播種区は令和6年10月18日播種、下甸播種区は令和6年10月31日播種
 参考: [麦類の生育ステージ予測シート Ver. 4.0\(追補\)](#)

令和6年播種（令和7年産）麦類生育調査ほ生育状況〔4月10日調査結果〕

表4 麦類生育調査ほ 生育状況

	品種	実施場所	草丈(cm)			茎数(本/m ²)			幼穂長(mm)			葉色 (GM値)
			本年	前年比(%)	平年比(%)	本年	前年比(%)	平年比(%)	本年	前年差	平年差	本年
大河原	シュンライ	角田市島田	20.7	—	—	332	—	—	2.8	—	—	45.5
	ホワイトファイバー	大河原町金ヶ瀬	33.1	122	—	1013	169	—	5.8	-5.1	—	47.7
仙台	シュンライ	仙台市宮城野区	36.9	72	—	424	76	—	27.8	-10.0	—	41.4
大崎	シラネコムギ	大崎市古川	28.1	76	113	927	73	95	4.1	-2.3	+0.9	41.6
美里	シラネコムギ	大崎市鹿島台	21.0	—	—	1327	—	—	1.6	—	—	44.3
	夏黄金	涌谷町猪岡	26.2	107	—	896	156	—	3.3	-2.7	—	51.4
登米	あおぼの恋	登米市豊里町	35.3	88	118	566	69	83	2.7	-5.1	-3.0	38.5
	シュンライ	石巻市桃生町	31.1	57	81	658	91	82	13.1	-22.0	-4.7	49.6
石巻	ミノリムギ	石巻市桃生町	36.4	102	122	890	126	133	13.9	-0.3	+6.8	44.3
	シラネコムギ	石巻市桃生町	30.6	98	—	856	110	—	2.6	-0.6	—	40.9

注1) 平年値は、過去7か年中の値から、最高値と最低値を除いた5か年の平均値。

注2) 大河原「シュンライ」は令和6年播種から調査値変更のため、前年値(比・差)、平年値(比・差)はない。

注3) 大河原「ホワイトファイバー」は、令和元年播種から調査のため、平年値(比・差)はない。

注4) 仙台「シュンライ」は、令和4年播種から調査のため、平年値(比・差)はない。

注5) 美里「シラネコムギ」は令和6年播種から調査地変更のため、平年値・前年値(比・差)はない。

注6) 美里「夏黄金」は令和元年播種から調査地変更のため、平年値(比・差)はない。

注7) 石巻「シラネコムギ」は令和5年播種から調査地変更のため、平年値(比・差)はない。

注8) 葉色は令和6年播種から測定を開始したため、前年値(比・差)、平年値(比・差)はない。

＜生育調査ほの状況等＞

大河原 「シュンライ」、「ホワイトファイバー」

- ・2月中下旬は降水量少ない。3月中旬に平年を上回る降水量であったが3月下旬は降水量が少なかった。4月上旬は平年を大幅に上回る降水量であった。
- ・気温は2月中旬から平年値を上回る状態が続いている。
- ・4月10日現在「シュンライ」では草丈は短く、茎数は少ない。幼穂長が2.8mmであることから幼穂形成始期は4月2日ごろと推測する。茎立期には達していない。「ホワイトファイバー」では幼穂長は5.8mmで、昨年(10.9mm)より小さい。幼穂長から推定される幼穂形成始期は3月10日ごろ、茎立期は4月7日ごろと推定される。

仙台 「シュンライ」

- ・3月の平均気温は、上中旬が平年並か高く、下旬は平年よりかなり高く推移した。
- ・3月上中旬は降水量が多い傾向であったが、3月下旬は少なかった。
- ・4月10日現在の生育量は、草丈36.9cm、茎数424.4本/m²、幼穂長は27.8mmとなっており、数日で減数分裂期に入ると推測される。

大崎 「シラネコムギ」

- ・気温は、3月第3、5、6半旬は高温で推移した。日照時間は3月以降の高温期は多照で推移し、4月上旬は少照傾向であった。降水量は、高温期は少雨、3月第1半旬18.5mm、第4半旬24.5mm、4月第1半旬に14mmの降雨があった。
- ・草丈は28.1cm、茎数は927本/m²だった。葉色は41.6(GM値)と前回調査から低下している。
- ・幼穂長は4.1mmで、節間伸長が始まり茎立期を迎えている。生育ステージ予測シートと気象庁2週間予測を基にした試算では、減数分裂期は平年並の4月27日、出穂期は1日遅い5月7日と予測される。

- ・一部ほ場ではスズメノテッポウやタネツケバナなどの雑草発生が見られる。

美里 「シラネコムギ」、「夏黄金」

- ・「シラネコムギ」、「夏黄金」とも3月下旬の高温で急速に茎数が増加している。
- ・幼穂長は平年に比べやや遅れており、幼穂形成始期は夏黄金では3月27日。（シラネコムギはR7産からほ場変更したため、平年値なし）

登米 「あおばの恋」

- ・3月下旬の強風の影響で、葉が砂等で擦れて、枯れたようになった。回復してきているが、ほ場の半分以上で生育が遅れている。
- ・4月10日時点の幼穂長は2.7mmとなっており、幼穂形成期は4月4日ごろ、出穂期は5月12日ごろと予測される。

石巻 「シュンライ」、「ミノリムギ」、「シラネコムギ」

- ・3月の平均気温は平年差+0.1℃、日照時間は平年比99%と平年並で、降水量は平年比44%と少雨であった。
- ・4月10日の生育量は、「シュンライ」の草丈は31.1cm、茎数は658本/m²、幼穂長は13.1mmだった。「ミノリムギ」の草丈は36.4cm、茎数は890本/m²、幼穂長は13.9mmだった。「シラネコムギ」の草丈は30.6cm、茎数は856本/m²、幼穂長は平年差2.6mmだった。