

令和8年度大豆作況試験生育状況（7月3日現在）

[生育概況]

○5月25日播種（5月25日実施）タンレイ、ミヤギシロメ

播種後、適度な降雨があったため、出芽は良好で、出芽日数は平年並となった(表2)。一方、6月第2半旬以降は、直近5年平均と比べて低温で推移したため(表1)、「タンレイ」、「ミヤギシロメ」ともに生育は平年と比べやや遅れ、主茎長、主茎節数、分枝数、総節数はいずれも平年を下回った(表3)。

○6月15日播種（6月12日実施）ミヤギシロメ

播種後の強雨により土壌表面にクラストが発生し、出芽への影響が懸念されたが、出芽日数はやや長期化したものの、出芽は良好で、その後の生育も順調である(表2)。

表1 半旬別の気象経過（古川アメダス）

項 目		5月	6月					
		6	1	2	3	4	5	6
平均気温	本年値(℃)	20.6	19.0	16.7	19.0	20.6	17.8	22.1
	平年差①(℃)	+3.6	+1.3	-1.5	+0.3	+1.3	-2.1	+1.6
	平年差②(℃)	+3.3	+1.5	-2.5	-1.5	-1.6	-4.1	-1.5
積算 日照時間	本年値(h)	48.4	31.1	13.7	40.4	32.2	10.9	42.7
	平年比①(%)	123	100	51	172	147	51	206
	平年比②(%)	133	93	47	158	81	64	141
積算降水量	本年値(mm)	5.5	40.0	17.5	18.5	16.5	157.5	17.5
	平年比①(%)	29	272	106	98	79	643	60
	平年比②(%)	12	182	94	129	102	1184	74

注1)「平年差(比)①」は、1991年から2020年の30年間の平均値との差(比)

注2)「平年差(比)②」は、直近5年(2021年～2025年)の平均値との差(比)

表2 出芽状況

品種名	播種期 (月/日)	出芽期 (月/日)	出芽日数			出芽良否
			本年	前年差	平年差	
タンレイ	5/25	6/1	7日	0日	0日	良
ミヤギシロメ	5/25	6/1	7日	0日	0日	良
ミヤギシロメ	6/12	6/21	9日	+3日	+2日	良

注1) 出芽日数は播種翌日から出芽期までの期間

注2) 平年差は過去5か年(R3～R7)の平均値との差

注3) 出芽良否: 出芽率80%以上を「良」、50%以下を「不良」、その中間を「中」とする

表3 生育調査結果（7月3日調査）

播種期	品種名	主茎長(cm)			主茎節数(節/本)			分枝数(本/本)			総節数(節/本)		
		本年値	前年差	平年差	本年値	前年差	平年差	本年値	前年差	平年差	本年値	前年差	平年差
5/25 播種	タンレイ	24	-2	-3	8.0	-0.2	-0.2	0.0	-0.3	-0.8	8.4	-1.1	-2.5
	ミヤギシロメ	27	+2	-2	7.6	-0.5	-0.5	0.0	-0.5	-1.1	8.0	-2.2	-3.2

注1) 平年差は過去5か年(R3～R7)の平均値との差

2) 栽植密度の設定は、条間75cm×株間20cm(1株2粒播種)[13.3本/㎡]とした