

令和4年産 麦作情報 第5号

宮城県亘理農業改良普及センター

令和4年6月3日発行

電話0223(34)1141 FAX0223(34)1143

ホームページ<https://www.pref.mivaqi.jp/site/wrnk/>

1 成熟期の目安（出穂期から40～45日後）

地区名	品種	播種時期		成熟期調査（6月1日）			出穂期	成熟期（予測） （出穂期から40～45日後）
				稈長 (cm)	穂長 (cm)	穂数 本/m ²		
名取市 本郷	シュンライ	11月10日	本年値	90.4	4.6	520	4月25日	6/4～6/9 頃
			平年比	110%	120%	116%		
名取市 植松	シュンライ	11月6日	本年値	71.8	3.4	348	4月25日	6/4～6/9 頃
			平年比	77%	91%	40%		
名取市 下増田	シュンライ	11月7日	本年値	85.9	4.1	478	4月24日	6/3～6/8 頃
			平年比	101%	105%	101%		
名取市 愛島	シュンライ	11月4日	本年値	86.3	4.1	392	4月25日	6/4～6/9 頃
			平年比	101%	98%	106%		
平均			本年値	83.6	4.0	434	4月25日	6/4～6/9 頃
			平年比	97%	104%	91%		

<参考> シュンライ品種特性表

採用年	出穂期	成熟期	稈長(cm)	穂長(cm)	穂数(本/m ²)	収量(kg/10a)
平成3年	4月29日	6月11日	83	3.8	493	483

※古川農業試験場奨励品種決定調査 平成14～16年の平均値

2 大麦の刈取適期の目安（成熟期からおおよそ3日後）

成熟期（出穂期から40～45日後）

- ・子実水分約40%
- ・穂の外観は、穂の基部のみに若干緑色が残る程度に黄化。
- ・指で押さえて乳汁がでない、口ウの硬さ。

3～4日



刈取り適期（成熟期から3～4日後）

- ・子実水分20～30%
- ・穂の外観は、全て緑色が抜け、穂首が黄色くなる。
- ・穂首の湾曲が散見される。（ほ場の3割程度）
- ・粒が硬くなり、爪で傷がつく。



5日～

刈遅れ（刈取り適期から5日以上後）

- ・子実水分20%未満
- ・穂の外観は、全体的に白っぽくなる。
- ・穂の湾曲が目立つ。（ほ場全体）
- ・粒は硬くなり、爪では傷がつかない。

3 大麦の調製の目安

- ・子実水分は、大麦 13.0%以下に仕上げましょう。
- ・篩い目は、大麦 2.4mmを基本としてください。